Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»



КАТАЛОГ

ВНИИМК



Баблоев Константин Георгиевич

Уважаемые коллеги!

Рады представить вам каталог селекционных достижений Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта».

ВНИИМК — ведущее научно-исследовательское учреждение Российской Федерации в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных культур с более чем вековой историей. Сегодня ВНИИМК — это стратегический центр отечественной селекции, производства семян высших репродукций для ежегодного сортообновления и сортосмены сортов и гибридов подсолнечника, сортов сои, льна, рапса, сурепицы, горчицы, рыжика, кориандра. Всего во ВНИИМК ведется селекция по 22 масличным и эфиромасличным культурам.

Ученые Центра создают сорта и гибриды, полагаясь на международный опыт, общемировые тенденции, а также собственные исследования и разработки, многие из которых не имеют аналогов ни в одном государстве.

Курс на мировое первенство в селекции масличных культур был взят во ВНИИМК в XX веке. Наш институт трудами академика Василия Степановича Пустовойта фактически создал новую техническую культуру, пригодную для промышленного производства, — подсолнечник. В процессе селекции он увеличил содержание масла в семенах подсолнечника с 32 до 54 %. Здесь же впервые был создан селекционный материал подсолнечника, обладающий комплексным иммунитетом к болезням и вредителям, а затем сорт подсолнечника с жирно-кислотным составом масла, аналогичным оливковому. Во всех странах, возделывающих подсолнечник, селекционная работа на повышение качества масла берет своё начало именно от этого сорта. Во ВНИИМК были созданы первый в мире безэруковый сорт горчицы сарептской, первый сорт озимой формы горчицы сарептской, ранее не существующей в природе, а также крупноплодный сорт подсолнечника СПК, ставший родоначальником производства крупноплодных сортов и гибридов в России.

Современная история ВНИИМК и, особенно, последнее десятилетие, ознаменовано не меньшими по значимости прорывами в селекции: получены первый в мире сорт масличного льна Ы 117, устойчивый к льноутомлению, первые в мире сорта кондитерского подсолнечника, устойчивые к имидазолиноновым гербицидам — Аладдин, и сульфонилмочевиновым гербицидам (д.в. трибенурон-метил) — Консул, а также гибрид подсолнечника с повышенным содержанием стеариновой кислоты в масле семян Стеарин, высокоолеиновый сорт озимого рапса Оливин, желтосемянный сорт ярового рапса Кенар, гигантский сорт сои Мамонт, линейка сортов сои с очень редким и для мировой практики признаками повышенной холодо- и заморозкоустойчивости, а также другие сорта и гибриды масличных культур, характеризующиеся высокой продуктивностью при выращивании даже в неблагоприятных условиях.

Научные исследования института носят комплексный характер. Помимо развития селекционных программ, совершенствования системы семеноводства и производства семян высших репродукций для ежегодного сортообновления, во ВНИИМК ведется разработка экологически безопасных технологий возделывания масличных

и эфиромасличных культур для различных зон; технологии генетической идентификации и паспортизации растений; новых экологически безопасных микробиопрепаратов, а также методов и приборов для анализа качества семян и масла масличных и эфиромасличных культур; создание машин и приспособлений для возделывания, уборки и послеуборочной обработки семян этих культур.

ВНИИМК сегодня — это современный технологический центр, обеспечивающий сельхозпроизводителей качественными сортами и гибридами масличных культур, которые занимают площадь более 3,5 млн га практически во всех регионах России, а также в странах ближнего зарубежья.

Сорта и гибриды селекции ВНИИМК не являются генно-модифицированными, они надежны и технологичны, обладают высоким потенциалом урожайности и устойчивостью к основным патогенам, реализуются широкому кругу покупателей по доступной цене.

Мы рады представить вам новый каталог селекционных достижений масличных культур, которые позволят обеспечить вашему предприятию получение гарантированного урожая и высокой прибыли.

Врио директора,
кандидат сельскохозяйственных наук,
заслуженный работник сельского хозяйства Кубани
Константин Георгиевич Баблоев




1,5 тыс.
СОТРУДНИКОВ

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, ОМСКОЙ, РОСТОВСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯХ

5
ФИЛИАЛОВ

2
ОПЫТНЫХ ХОЗЯЙСТВА

Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта выращивает и поставляет сельхозпродукцию на крупнейшие предприятия страны и ближнего зарубежья, производит семена подсолнечника, сои, масличного льна, рапса, горчицы и других масличных культур, оказывает бесплатные консультационные услуги по технологиям выращивания сортов и гибридов, а также проводит фундаментальные исследования в области молекулярной генетики, защиты растений, биохимии



18
СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ

80
РЕГИОНОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

22
МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

3,5 млн га
ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ

130
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОСЕВОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

350
СОРТОВ И ГИБРИДОВ

Сорта и гибриды масличных культур селекции ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК выращиваются на территории от Запорожской области до регионов Восточной Сибири. Охватывая более 80 субъектов Российской Федерации, Центр обеспечивает сельхозпроизводителей разнообразными по степени и уровню адаптивности к неблагоприятным условиям сортами и гибридами масличных культур

Испытания подсолнечника, сои, масличного льна, рапса, горчицы и других культур проводятся на участках в различных почвенно-климатических условиях, как в благоприятных (на орошении), так и в зонах с недостаточным увлажнением или на искусственном зараженном фоне. В результате многолетних испытаний в производство допускаются сорта и гибриды, способные формировать рентабельный урожай в условиях засухи, холода, подтоплений или даже многолетней мерзлоты

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

ВНИИМК

Селекция

Селекция высокопродуктивных, с повышенным качеством масла, белка, эфирных масел сортов и гибридов масличных и эфиромасличных культур, устойчивых к основным болезням и вредителям, традиционными методами с включением маркер-вспомогательной и геномной селекции

Семеноводство

Совершенствование системы семеноводства и производство семян высших репродукций для ежегодного сортообновления в РФ

Агротехнологии

Разработка адаптивных, экологически безопасных технологий возделывания масличных культур для различных зон РФ

Аналитическое приборостроение

Разработка инструментальных методов контроля показателей качества семян масличных культур и продуктов их переработки на основе методов ЯМР

Механизация

Создание машин и приспособлений для возделывания, уборки и послеуборочной обработки семян масличных культур



ВНИИМК

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДСОЛНЕЧНИК 11

ПОДСОЛНЕЧНИК. ГИБРИДЫ

Очень ранняя группа спелости 12
Спринт 12
Ранняя группа спелости 13
Горфилд 13
Ирэн 14
Протектор НОВИНКА 15
Сури НОВИНКА 16
Среднеранняя группа спелости 17
Арсенал ОР НОВИНКА 17
Гермес 18
Горстар 19
Грант 20
Ермак НОВИНКА 21
Имми 22
Клип ВО НОВИНКА 23
Статус 24
Стеарин НОВИНКА 25
Суринат НОВИНКА 26
Сурус ОР НОВИНКА 27
Тайфун 28
Тайзар НОВИНКА 29
Форгут НОВИНКА 30
Фактор 31
Фогор НОВИНКА 32
Средняя группа спелости 33
Арис 33
Арис ИМИ НОВИНКА 34
Арнеб 35
Арнеб СУР НОВИНКА 36
Аурус 37
Клип 38
Лаврус НОВИНКА 39
Натали 40
Окси 41
Ризор НОВИНКА 42
Сурус 43

ПОДСОЛНЕЧНИК. КОНДИТЕРСКИЕ СОРТА

Ранняя группа спелости 44
Белочка 44
Консул НОВИНКА 45
Среднеранняя группа спелости 46
Аладдин НОВИНКА 46
Джинн 47
Казак НОВИНКА 48
Средняя группа спелости 49
Караван 49
Кондитер 50
СПК плюс 51

ПОДСОЛНЕЧНИК. МАСЛИЧНЫЕ СОРТА

Очень ранняя группа спелости 52
ВНИИМК 100 52
Иртыш 53
Казачий 54
Кремень НОВИНКА 55
Скормас 56
Юбиляр НОВИНКА 57
Ранняя группа спелости 58
Бузулук 58
Бузулук СУР НОВИНКА 59
Круиз 60
Успех 61
Среднеранняя группа спелости 61
Варяг 62
Умник 63
Средняя группа спелости 64
Донской 95 НОВИНКА 64
Мастер 65
Среднепоздняя группа спелости 66
Белоснежный 66

СОЯ 67

Очень ранняя группа спелости 68
Баргузин НОВИНКА 68
Вита 69
Забава НОВИНКА 70
Липчанка НОВИНКА 71
Лира 72
Пума 73
Саяна НОВИНКА 74

Ранняя группа спелости 75
Вига НОВИНКА 75
Грея НОВИНКА 76
Ирбис 77
Кора 78
Любава НОВИНКА 79
Олимпия 80
Парус 81
Селена 82
Славия 83
Триада НОВИНКА 84
Чара 85
Среднеранняя группа спелости 86
Елисей НОВИНКА 86
Рысь НОВИНКА 87
Себур НОВИНКА 88
Среднеспелая группа спелости 89
Барс 89
Весточка 90
Вилана 91
Вилана бета 92
Зара 93
Иней 94
Мамонт НОВИНКА 95
Ягуар НОВИНКА 96

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН 97
Ранняя группа спелости 98
Светлячок 98
Северный 22 НОВИНКА 99
Средняя группа спелости 100
Авангард 100
Август 101
Амбер 102
Бархан НОВИНКА 103
Бирюза 104
ВНИИМК 620 ФН 105
Даник 106
Небесный 107
Нилин 108
Радуга 109
Ручеёк 110
РФН 111
Сания НОВИНКА 112
Снегурок 113
Фианит НОВИНКА 114
ФЛИЗ 115
ФЛИЗ ЗУ НОВИНКА 116
Ы 117 117
Ы 220 НОВИНКА 118

РАПС 119
РАПС ЯРОВОЙ
Очень ранняя группа спелости 120
Таврион 120
Ранняя группа спелости 121
Амулет 121
Викинг-ВНИИМК 122
Кенар НОВИНКА 123
Руян 124
Среднеранняя группа спелости 125
Ермак 125
Баланс НОВИНКА 126
Ярило 127
Средняя группа спелости 128
55 Регион 128
Арбалет 129
Гранит 130
Риф 131
Сибиряк 60 НОВИНКА 132
Триумф НОВИНКА 133
Форпост КЛ 134
Флагман 125
Эребус 136
Юбилейный 23 НОВИНКА 137
Среднепоздняя группа спелости 138
Антарес 138
Арктур КЛ НОВИНКА 139
Прометей 140
Сириус 141
Спутник КЛ НОВИНКА 142
Фаворит 143

ВНИИМК

СОДЕРЖАНИЕ

РАПС ОЗИМЫЙ

Ранняя группа спелости 144

Актив 144

Элвис 145

Среднеранняя группа спелости 146

Дебют (гибрид) НОВИНКА 146

Лорис 147

Сармат 148

Средняя группа спелости 149

Селегор 149

Среднепоздняя группа спелости 150

Оливин НОВИНКА 150

ГОРЧИЦА 151

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

Очень ранняя группа спелости 152

Бэлла 152

Колла 153

Рапсодия 154

Ранняя группа спелости 155

Пиканто НОВИНКА 155

Радуга 156

Руслана 157

Фея 158

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

Очень ранняя группа спелости 159

Валента НОВИНКА 159

Горлинка 160

Мария 161

Ранняя группа спелости 162

Дюна НОВИНКА 162

Ника 163

Среднеранняя группа спелости 164

Галатея НОВИНКА 164

Юнона 165

Средняя группа спелости 166

Алиса 166

ГОРЧИЦА ЧЁРНАЯ

Ранняя группа спелости 167

Ниагара 167

ГОРЧИЦА ОЗИМАЯ САРЕПТСКАЯ

Среднепоздняя группа спелости 168

Джуна 168

Вьюжанка 169

СУРЕПИЦА 171

СУРЕПИЦА ЯРОВАЯ

Очень ранняя группа спелости 172

Грация 172

Ранняя группа спелости 173

Золотистая 173

Медовая НОВИНКА 174

СУРЕПИЦА ОЗИМАЯ

Ранняя группа спелости 175

Гордея 175

Любава 176

РЫЖИК 177

РЫЖИК ЯРОВОЙ

Очень ранняя группа спелости 178

Крепыш НОВИНКА 178

Ранняя группа спелости 179

Омич 179

Кристалл 180

РЫЖИК ОЗИМЫЙ

Ранняя группа спелости 181

Карат 181

КОРИАНДР 184
Алексеевский 413 184

МЯТА 184
Розовская арома 184

ЛАВАНДА 185
Вознесенская 34 185
Вознесенская арома 185

ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ 186
Вознесенский 24 186
Татьяна НОВИНКА 186

КУНЖУТ 187
Солнечный 187
Удача НОВИНКА 187

САФЛОР 188
Алмаз 188
Лидер НОВИНКА 188

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МАСЛИЧНЫХ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ВНИИМК

ДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕГИОНАМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. СЕВЕРНЫЙ
Архангельская область
Мурманская область
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий автономный округ

2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область

3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область

4. ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
Кировская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Свердловская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

5. ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область

6. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ростовская область
Ставропольский край
Чеченская Республика

7. СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
Пензенская область
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Ульяновская область

8. НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область

9. УРАЛЬСКИЙ
Курганская область
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Челябинская область

10. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Томская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

11. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
Забайкальский край
Иркутская область
Красноярский край
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия

12. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Амурская область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ





ПОДСОЛНЕЧНИК



СПРИНТ®

ГИБРИД

36 ц/га
потенциальная урожайность

Короткий вегетационный период

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Очень ранний

Преимущества
Высокая стабильность продуктивности в различных условиях выращивания, высокая масличность

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 60–65 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	86–88
Масличность, %	49
Высота растения, см	150
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Короткий период вегетации позволяет выращивать гибрид не только в основных, но и в пожнивных и поукосных посевах. При оптимальных сроках сева хозяйственная спелость растений наступает к концу уборки колосовых культур. Это позволяет раньше приступить к его уборке и создает хорошие условия для подготовки полей под посев озимых культур

Урожайность в производственных посевах



- **Ростовская область** 35,1 ц/га
- **Республика Адыгея** 36,0 ц/га
- **Саратовская область** 33,7 ц/га



ГОРФИЛД®

ГИБРИД

42 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к заразихе

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Стабильная урожайность, устойчивость к основным болезням


Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	90–93
Масличность, %	50
Высота растения, см	160
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Стеблевая гниль



Альтернариоз



Гниль корзинок



Особенности

Гибрид интенсивного типа, устойчив к ложной мучнистой росе, толерантен к фомопсису. В полевых условиях не поражается вертициллёзом, ржавчиной, альтернариозом. Высокая масличность, хорошая отзывчивость на высокий агрофон

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
37,8 ц/га

● **Саратовская область**
36,7 ц/га

● **Курская область**
40,0 ц/га



ИРЭН®

ГИБРИД

43 ц/га
потенциальная урожайность

Классический гибрид

Регион допуска
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Устойчивость к комплексу рас заразихи (A–E) и ложной мучнистой росе

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95–97
Масличность, %	50
Высота растения, см	185
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и масличности. Высокотолерантен к фомопсису и белой гнили

Урожайность в производственных посевах



- **Кабардино-Балкарская Республика** 40,1 ц/га
- **Ставропольский край** 42,1 ц/га
- **Ростовская область** 39,7 ц/га



ПРОТЕКТОР®

ГИБРИД

40 ц/га
потенциальная урожайность

Генетическая устойчивость к заразихе

Регион допуска
5, 7, 8, 9

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Стабильная урожайность, устойчивость ко всем расам ложной мучнистой росы

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	90–92
Масличность, %	48
Высота растения, см	145
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Поздний период всходов компенсируется урожайностью. Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания. Предназначен для выращивания в регионах с распространением вирулентных рас заразихи и возбудителя ЛМР, а также для технологии органического земледелия

Урожайность в производственных посевах



● **Оренбургская область**
39,1 ц/га



СУРИ®

ГИБРИД

40 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к сульфонилмочевиновым гербицидам (д.в. трибенурон-метил)

Регион допуска
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность и устойчивость к полеганию

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием сульфонилмочевиновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	92–94
Масличность, %	50
Высота растения, см	180
Устойчивость к заразихе	A–E

Особенности


Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям выращивания. Устойчив к комплексу рас заразихи (A–E) и ложной мучнистой росе

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Стеблевая гниль



Альтернариоз



Гниль корзинок



Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
35,3 ц/га

● **Республика Татарстан**
31,8 ц/га

● **Оренбургская область**
39,5 ц/га



АРСЕНАЛ ОР®

ГИБРИД

38 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к заразихе

Регион допуска
5, 6, 7, 9

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Устойчивость к засухе и основным болезням

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	97–99
Масличность, %	47
Высота растения, см	185
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Характеризуется средней холодостойкостью. Имеет высокую устойчивость к полеганию. Обладает высокой толерантностью к фомопсису, устойчивостью к ложной мучнистой росе

Урожайность в производственных посевах



- **Воронежская область** 31,8 ц/га
- **Липецкая область** 37,1 ц/га
- **Республика Адыгея** 36,6 ц/га



ГЕРМЕС®

ГИБРИД

38 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание олеиновой кислоты

Регион допуска
5

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая продуктивность, стабильно высокое (более 90 %) содержание олеиновой кислоты в масле

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95–97
Масличность, %	49
Высота растения, см	175
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Интенсивный тип, хорошо отзывается на высокий агрофон. Приспособлен к возделыванию в различных почвенно-климатических зонах. Имеет хороший темп роста, устойчив к стрессовым факторам. Обладает повышенной засухоустойчивостью

Урожайность в производственных посевах



- **Воронежская область** 31,7 ц/га
- **Липецкая область** 35,8 ц/га
- **Белгородская область** 29,1 ц/га



ГОРСТАР®

ГИБРИД

43 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к основным болезням

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Устойчивость к семи расам заразихи (A–G), ложной мучнистой росе

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95–97
Масличность, %	49
Высота растения, см	170
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Хорошо отзывается на высокий агрофон. Обладает устойчивостью к ложной мучнистой росе, толерантностью к фомопсису. Не поражается вертициллёзом, ржавчиной, альтернариозом

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
31,5 ц/га

● **Ростовская область**
41,3 ц/га

● **Курская область**
40,5 ц/га



ГРАНТ®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к заразихе

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Устойчивость к семи расам заразихи (A–G), ложной мучнистой росе

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95–98
Масличность, %	50
Высота растения, см	165
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Гибрид со стабильной урожайностью, толерантен к фомопсису. В полевых условиях слабо поражается ржавчиной, вертициллёзом, не повреждается подсолнечной огнёвкой

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 41,3 ц/га
- **Ростовская область** 44,1 ц/га
- **Кемеровская область** 40,1 ц/га



ЕРМАК®

ГИБРИД

35 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к ложной мучнистой росе

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Генетическая устойчивость к основным расам ложной мучнистой росы


Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	92–94
Масличность, %	51
Высота растения, см	162
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Стеблевая гниль



Альтернариоз



Гниль корзинок



Особенности

Обладает устойчивостью к комплексу рас заразихи (A–E). Толерантен к фомопсису. Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 31,8 ц/га
- **Ростовская область** 35,0 ц/га
- **Ставропольский край** 30,0 ц/га



ИММИ®

ГИБРИД

35 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая экологическая пластичность, высокая масличность

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием имидазолиноновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	94–96
Масличность, %	50
Высота растения, см	185
Устойчивость к заразихе	А–Е

Особенности


Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям выращивания, умеренно восприимчив к белой гнили, ложной мучнистой росе

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Стеблевая гниль



Альтернариоз



Гниль корзинок



Урожайность в производственных посевах



- **Кабардино-Балкарская Республика** 31,7 ц/га
- **Орловская область** 30,6 ц/га
- **Пензенская область** 29,8 ц/га



КЛИП ВО®

ГИБРИД

41 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание олеиновой кислоты

Регион допуска
6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам

замена оливковому маслу

Характеристики

Вегетационный период, сут.	94–98
Масличность, %	48
Высота растения, см	160
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Особенности

Предназначен для выращивания в производственных системах на основе использования имидазолинонов с целью получения высокоолеинового масла из товарных семян. Гибрид характеризуется высоким потенциалом продуктивности и содержанием олеиновой кислоты в масле 86 %. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Урожайность в производственных посевах



- **Кабардино-Балкарская Республика** 40,6 ц/га
- **Краснодарский край** 41,0 ц/га
- **Саратовская область** 39,9 ц/га



СТАТУС®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к заразихе

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая масличность, хорошая отзывчивость на высокий агрофон

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95–98
Масличность, %	50
Высота растения, см	175
Устойчивость к заразихе	A–G

Особенности

Растения выравнены по высоте и прохождению фаз развития. Отличается устойчивостью к семи расам заразихи (A–G) за счет устойчивости к патогену обеих родительских линий

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
41,5 ц/га

● **Ростовская область**
44,1 ц/га

● **Пензенская область**
39,9 ц/га



СТЕАРИН®

ГИБРИД

40 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание стеариновой и олеиновой кислот

Регион допуска
5, 6, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Альтернатива пальмовому маслу и частично гидрогенизированным жирам

для кондитерской промышленности

Характеристики

Вегетационный период, сут.	92–96
Масличность, %	50
Высота растения, см	156
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Масло содержит 3 % линолевой, 13 % стеариновой и 75 % олеиновой кислот. Изменённый состав качества масла может устранить необходимость гидрогенизации подсолнечного масла, способствовать повышению его окислительной стабильности. Гибрид устойчив к семи расам заразихи (A–G). Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Урожайность в производственных посевах



- **Воронежская область** 31,8 ц/га
- **Курганская область** 40,0 ц/га
- **Алтайский край** 37,7 ц/га



СУРИНАТ®

ГИБРИД

44 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к сульфонилмочевиновым гербицидам (д.в. трибенурон-метил)

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям выращивания

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием сульфонилмочевиновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	93–95
Масличность, %	49
Высота растения, см	200
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Устойчив к комплексу рас заразихи (A–E) и ложной мучнистой росе. Применение гербицида с д.в. трибенурон-метил позволяет контролировать широкий спектр двудольных сорняков, в том числе осот и др.

Урожайность в производственных посевах



- **Кабардино-Балкарская Республика** 40,5 ц/га
- **Липецкая область** 40,6 ц/га
- **Пензенская область** 43,7 ц/га



СУРУС ОР®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к сульфонилмочевиновым гербицидам (д.в. трибенурон-метил)

Регион допуска
5, 6, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Генетическая устойчивость к заразихе

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием сульфонилмочевиновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 50-55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	96–100
Масличность, %	50
Высота растения, см	185
Устойчивость к заразихе	A–G

Особенности


Адаптирован к неблагоприятным факторам среды. Отличается устойчивостью к распространенным расам ложной мучнистой росы. Генетически близок к гибриду Сурус

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Стеблевая гниль



Альтернариоз



Гниль корзинок



Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
44,1 ц/га

● **Липецкая область**
41,2 ц/га

● **Оренбургская область**
43,1 ц/га



ТАЙЗАР®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к заразихе

Регион допуска
5, 6, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая масличность, хорошая отзывчивость на высокий агрофон

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	96–98
Масличность, %	52
Высота растения, см	200
Устойчивость к заразихе	A–G

Особенности

Устойчив к семи расам заразихи (A–G) и ложной мучнистой росе. Хорошо отзывается на высокий агрофон

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Урожайность в производственных посевах



- **Оренбургская область** 44,1 ц/га
- **Липецкая область** 43,1 ц/га
- **Курская область** 41,1 ц/га



ТАЙФУН®

ГИБРИД

41 ц/га
потенциальная урожайность

Комплексная устойчивость к основным патогенам и стрессорам

Регион допуска
5, 6, 8

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Устойчивость к комплексу рас заразихи (A–E), хорошая отзывчивость на высокий агрофон

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95–97
Масличность, %	53
Высота растения, см	200
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Характеризуется хорошей выравненностью по датам всходов и цветения, устойчивостью к полеганию и одновременным созреванием растений. Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям выращивания

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 37,7 ц/га
- **Белгородская область** 32,5 ц/га
- **Орловская область** 37,1 ц/га



ФАКТОР®

ГИБРИД

40 ц/га
потенциальная урожайность

Короткий вегетационный период

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям выращивания

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	92–94
Масличность, %	51
Высота растения, см	182
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Гибрид подсолнечника умеренно интенсивного типа. Высокая толерантность к фомопсису. Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания

Урожайность в производственных посевах



- **Белгородская область** 33,6 ц/га
- **Краснодарская край** 37,8 ц/га
- **Самарская область** 36,1 ц/га



ФОГОР®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая масличность семян

Регион допуска
6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Повышенная устойчивость к семи расам заразихи (A–G), высокая масличность

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	94–97
Масличность, %	48
Высота растения, см	170
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Гибрид устойчивый к заразихе за счёт устойчивости родительских линий к паразиту. Толерантен к ложной мучнистой росе. В полевых условиях не поражается вертициллёзом, альтернариозом, не повреждается подсолнечниковой огнёвкой. Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания

Урожайность в производственных посевах



- **Оренбургская область** 37,7 ц/га
- **Краснодарский край** 32,1 ц/га
- **Республика Мордовия** 29,7 ц/га



ФОРГУТ®

ГИБРИД

33 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к заразихе

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Повышенная устойчивость к заразихе, устойчивость к ложной мучнистой росе

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	97–99
Масличность, %	45
Высота растения, см	170
Устойчивость к заразихе	A–G

Особенности

Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания. Обладает повышенной генетической устойчивостью к семи расам заразихи (A–G) за счет наличия данного признака у обеих родительских линий

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Урожайность в производственных посевах



- **Ростовская область** 31,7 ц/га
- **Ульяновская область** 28,1 ц/га
- **Самарская область** 26,7 ц/га



АРИС®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Засухоустойчивость

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая степень адаптации к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, устойчивость к болезням

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	100–102
Масличность, %	51
Высота растения, см	195
Устойчивость к заразихе	A–E

Особенности


Адаптирован к неблагоприятным факторам среды Устойчив к комплексу рас заразихи (A–E) и ложной мучнистой росе. Высокотолерантен к фомопсису и белой гнили. В полевых условиях слабо поражается ржавчиной и сухой гнилью

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Стеблевая гниль



Альтернариоз



Гниль корзинок



Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 41,8 ц/га
- **Ставропольский край** 43,1 ц/га
- **Саратовская область** 44,4 ц/га



АРИС ИМИ®

ГИБРИД

40 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Повышенная устойчивость к стрессовым условиям среды и полеганию

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием имидазолиноновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	99–101
Масличность, %	47
Высота растения, см	170
Устойчивость к заразихе	A–E

Особенности


Устойчив к ложной мучнистой росе. Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Стеблевая гниль



Альтернариоз



Гниль корзинок



Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 37,3 ц/га
- **Ставропольский край** 40,0 ц/га
- **Саратовская область** 38,4 ц/га



АРНЕБ®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Интенсивный тип

Регион допуска
6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Устойчивость к комплексу рас заразихи (A–E) и ложной мучнистой росе

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	100–102
Масличность, %	50
Высота растения, см	185
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Пригоден для выращивания на орошении. Высокотолерантен к фомопсису, белой и серой гнилям. Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 43,1 ц/га
- **Ставропольский край** 44,4 ц/га
- **Кабардино-Балкарская Республика** 43,3 ц/га



АРНЕБ СУР®

ГИБРИД

40 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к сульфонилмочевиновым гербицидам (д.в. трибенурон-метил)

Регион допуска
6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая урожайность, устойчивость к комплексу рас заразихи (A–E)

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием сульфонилмочевиновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 50-55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	101–102
Масличность, %	48
Высота растения, см	200
Устойчивость к заразихе	A–E

Особенности

Гибрид устойчивый к ложной мучнистой росе, толерантный к фомопсису. Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Урожайность в производственных посевах



- **Ставропольский край** 38,4 ц/га
- **Республика Крым** 40,0 ц/га
- **Республика Адыгея** 39,7 ц/га



АУРУС®

ГИБРИД

44 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая экологическая пластичность

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	101–102
Масличность, %	51
Высота растения, см	175
Устойчивость к заразихе	А–Е

Особенности

Устойчив к комплексу рас заразихи (А–Е) и ложной мучнистой росе. В полевых условиях очень слабо поражается сухой гнилью. Толерантен к фомопсису

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Урожайность в производственных посевах



- **Кабардино-Балкарская Республика** 41,0 ц/га
- **Липецкая область** 42,1 ц/га
- **Пензенская область** 43,2 ц/га



КЛИП®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам

Регион допуска
6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая урожайность и масличность, экологическая пластичность

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием имидазолиноновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	100–102
Масличность, %	50
Высота растения, см	185
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Гибрид интенсивного типа, обладает высоким потенциалом продуктивности при благоприятных условиях выращивания. Характеризуется среднеолеиновым типом масла

Урожайность в производственных посевах



- **Кабардино-Балкарская Республика** 43,3 ц/га
- **Краснодарский край** 44,1 ц/га
- **Саратовская область** 37,7 ц/га



ЛАВРУС®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к заразихе

Регион допуска
5, 6, 8, 9, 10

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Устойчивость к сульфонилмочевиновым гербицидам


Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием сульфонилмочевиновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	99–100
Масличность, %	48
Высота растения, см	180
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Стеблевая гниль



Альтернариоз



Гниль корзинок



Особенности

Устойчивость к семи расам заразихи (A–G) и распространённым расам ложной мучнистой росы. Хорошо отзывается на высокий агрофон. Генетически близок к гибриду Тайзар

Урожайность в производственных посевах



- **Липецкая область** 44,1 ц/га
- **Ростовская область** 41,7 ц/га
- **Оренбургская область** 43,1 ц/га



НАТАЛИ®

ГИБРИД

44 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям выращивания

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	100–102
Масличность, %	50
Высота растения, см	185
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и масличности семян

Урожайность в производственных посевах



- **Кабардино-Балкарская Республика** 38,2 ц/га
- **Ставропольский край** 40,1 ц/га
- **Республика Адыгея** 44,0 ц/га



ОКСИ®

ГИБРИД

35 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание олеиновой кислоты в масле

Регион допуска
5

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Изменённый состав токоферолов. Окислительная стабильность масла в 14 раз превышает обычный генотип

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	106–108
Масличность, %	49
Высота растения, см	210
Устойчивость к заразихе	А–Е

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Стабильная продуктивность в различных условиях выращивания. Для сохранения высокого уровня содержания олеиновой кислоты, гамма- и дельта-токоферолов рекомендуется выращивать на удалении от простых масличных гибридов и применять десикацию, так как данный гибрид относится к типу stay green. Имеет отличную устойчивость к основным болезням

Урожайность в производственных посевах



- **Белгородская область** 33,4 ц/га
- **Орловская область** 31,8 ц/га
- **Липецкая область** 34,1 ц/га



РИЗОР

ГИБРИД

41 ц/га
потенциальная урожайность

Стабильная урожайность

Регион испытания
5, 6, 7, 8, 9

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Повышенная устойчивость к семи расам заразихи (A–G)

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	100–103
Масличность, %	49
Высота растения, см	190
Устойчивость к заразихе	A–G

Особенности

Высокорослый гибрид, характеризуется высокой масличностью, стабильной урожайностью. Растения гибрида выравнены по высоте, отличаются дружностью цветения и созревания

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Краснодарский край**
41,0 ц/га

● **Липецкая область**
40,1 ц/га

● **Курская область**
39,1 ц/га



СУРУС®

ГИБРИД

45 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к сульфонилмочевиновым гербицидам (д.в. трибенурон-метил)

Регион допуска
5, 6, 8, 9, 10

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям выращивания

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием сульфонилмочевиновых гербицидов. Оптимальная густота стояния к уборке 50-55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	100–102
Масличность, %	52
Высота растения, см	190
Устойчивость к заразихе	А–Е

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Стеблевая гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Применение гербицида с д.в. трибенурон-метил позволяет контролировать широкий спектр двудольных сорняков, в том числе осот и др. Устойчив к комплексу рас заразихи (А–Е) и ложной мучнистой росе. Характеризуется среднеолеиновым типом масла

Урожайность в производственных посевах



- **Оренбургская область** 44,1 ц/га
- **Краснодарский край** 43,9 ц/га
- **Курганская область** 39,8 ц/га



БЕЛОЧКА®

КОНДИТЕРСКИЙ СОРТ

36 ц/га
потенциальная урожайность

Короткий период вегетации

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность, выравненность растений по высоте, срокам цветения и созревания


Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 25–30 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	90–94
Масса 1000 семян, г	140
Масличность, %	46
Высота растения, см	175
Устойчивость к заразихе	А–Е

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз



Гниль корзинок



Особенности

Сорт интенсивного типа, используется в регионах, имеющих потребность в крупноплодных сортах с коротким периодом вегетации. Семена крупные, хорошо выполненные

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 31,4 ц/га
- **Саратовская область** 33,2 ц/га
- **Курская область** 30,2 ц/га



КОНСУЛ

КОНДИТЕРСКИЙ СОРТ

39 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к сульфонилмочевиновым гербицидам (д.в. трибенурон-метил)

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 10

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность, устойчивость к комплексу рас заразихи

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием сульфонилмочевиновых гербицидов. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 25-30 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	93–95
Масса 1000 семян, г	130
Масличность, %	46
Высота растения, см	165
Устойчивость к заразихе	A–E

Особенности


Первый в мире крупноплодный сорт подсолнечника, устойчивый к сульфонилмочевиновым гербицидам. Обладает повышенным уровнем автофертильности

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз



Гниль корзинок



Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
37,6 ц/га

● **Саратовская область**
36,0 ц/га

● **Белгородская область**
37,8 ц/га



АЛАДДИН®

КОНДИТЕРСКИЙ СОРТ

44 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам

Регион допуска
5, 6, 7, 8, 9

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Оптимальное соотношение высокой урожайности, масличности и массы 1000 семян

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием имидазолиноновых гербицидов. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 30 тыс. раст/га

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	96–98
Масса 1000 семян, г	120
Масличность, %	48
Высота растения, см	175
Устойчивость к заразихе	A–E

Особенности

Первый в мире крупноплодный сорт подсолнечника, устойчивый к имидазолиноновым гербицидам, обладает повышенным уровнем автофертильности. Растения выравнены по высоте, цветению и созреванию. Семена крупные, хорошо выполненные, с высокой натурой

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 44,0 ц/га
- **Республика Мордовия** 39,1 ц/га
- **Ростовская область** 42,8 ц/га



ДЖИНН®

КОНДИТЕРСКИЙ СОРТ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Стабильность урожая и массы 1000 семян

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 25–30 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	96–98
Масса 1000 семян, г	145
Масличность, %	47
Высота растения, см	205
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Стабильно высокая продуктивность в большинстве агроклиматических зон выращивания. Растения сорта высокорослые, хорошо облиственные, выравнены по высоте, срокам цветения и созревания. Сорт устойчив к полеганию и отличается повышенной засухоустойчивостью

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 35,3 ц/га
- **Саратовская область** 36,9 ц/га
- **Тамбовская область** 39,1 ц/га



КАЗАК

КОНДИТЕРСКИЙ СОРТ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к заразихе

Регион испытания
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Устойчивость к семи расам заразихи (A–G), отзывчивость на удобрения

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 25–30 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	96–98
Масса 1000 семян, г	140
Масличность, %	47
Высота растения, см	190
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

В зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения способен реализовать потенциал продуктивности при высоком уровне агрофона. Устойчив к полеганию. Семена крупные, хорошо выполненные

Урожайность в экологическом сортоиспытании



- **Краснодарский край** 38,3 ц/га
- **Ставропольский край** 37,2 ц/га
- **Ростовская область** 39,7 ц/га



КАРАВАН®

КОНДИТЕРСКИЙ СОРТ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Выравненность по фазам цветения и созревания

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям, отзывчивость на высокий агрофон


Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 25–30 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	97–100
Масса 1000 семян, г	145
Масличность, %	47
Высота растения, см	205
Устойчивость к заразихе	A–F

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз




Гниль корзинок



Особенности

Сорт характеризуется высокими темпами начального роста, высокой толерантностью к основным болезням, устойчивостью к полеганию

Урожайность в производственных посевах



● **Кабардино-Балкарская Республика**
38,0 ц/га

● **Липецкая область**
37,0 ц/га

● **Пензенская область**
38,4 ц/га



КОНДИТЕР®

КОНДИТЕРСКИЙ СОРТ

44 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Повышенная продуктивность, высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 25–30 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	98–100
Масса 1000 семян, г	150
Масличность, %	47
Высота растения, см	210
Устойчивость к заразихе	A–F

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Сорт отличается высокой энергией начального роста. Выравнен по высоте растений, цветению и созреванию

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 41,9 ц/га
- **Белгородская область** 40,7 ц/га
- **Республика Мордовия** 43,4 ц/га



СПК ПЛЮС®

КОНДИТЕРСКИЙ СОРТ

52 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая масса 1000 семян

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Способность максимально реализовать потенциал продуктивности в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 25–30 тыс. раст/га


Характеристики

Вегетационный период, сут.	98–100
Масса 1000 семян, г	160
Масличность, %	47
Высота растения, см	215


Устойчивость к заразихе A–F

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз



Гниль корзинок



Особенности

Сорт нового поколения, обладает крупной корзинкой с хорошо выполненными семенами. Характеризуется высокой массой 1000 семян. Высокоустойчив к полеганию

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 51,8 ц/га
- **Липецкая область** 50,3 ц/га
- **Белгородская область** 42,5 ц/га



ВНИИМК 100®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

32 ц/га
потенциальная урожайность

Выравненность по высоте и фазам вегетации

Регион допуска
3, 5, 6, 7, 8, 9

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Устойчивость к комплексу рас заразихи (A–E) и полеганию

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	80–82
Масличность, %	51
Высота растения, см	155
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

В Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском регионах рекомендуется для повторных пожнивных и поукосных посевов и для пересева. Предельно допустимый срок посева 1 июля. Созревает без применения десикации

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 29,3 ц/га
- **Самарская область** 29,1 ц/га
- **Брянская область** 30,1 ц/га



ИРТЫШ®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

30 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая масличность семян

Регион допуска
9, 10

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к условиям Западной Сибири и Урала

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 45–55 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	75–80
Масличность, %	55
Высота растения, см	140
Устойчивость к заразихе	А–Е

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Короткий период вегетации позволяет выращивать сорт в жестких погодных условиях с минимальной потерей урожайности

Урожайность в производственных посевах



- **Алтайский край** 26,1 ц/га
- **Омская область** 30,0 ц/га
- **Оренбургская область** 29,7 ц/га



КАЗАЧИЙ

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

38 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая устойчивость к засухе

Регион допуска
6, 7, 8, 10

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Пластичность, стабильность, надёжность

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	82–85
Масличность, %	52
Высота растения, см	150
Устойчивость к заразихе	А–Е

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Сорт интенсивного типа, хорошо отзывается на высокий агрофон. Устойчив к полеганию за счёт прочного стебля и мощной корневой системы

Урожайность в производственных посевах



- **Ростовская область** 36,7 ц/га
- **Волгоградская область** 37,1 ц/га
- **Саратовская область** 35,6 ц/га



КРЕМЕНЬ®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

35 ц/га
потенциальная урожайность

Скороспелость и высокая масличность

Регион допуска
5, 6, 7, 9

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Оптимальное соотношение высокой урожайности, скороспелости и масличности


Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	81–83
Масличность, %	53
Высота растения, см	160
Устойчивость к заразихе	A–F

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз



Гниль корзинок



Особенности

Сорт пригоден для выращивания в пожнивных и поукосных посевах. Отличается высокой полевой устойчивостью к фузариозу и сухой гнили. Высокоустойчив к полеганию

Урожайность в производственных посевах





СКОРМАС®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

32 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность

Регион допуска
5, 8, 9

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Выравненность по высоте растений, дружность цветения и созревания

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	80–82
Масличность, %	52
Высота растения, см	160
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Короткий период вегетации позволяет выращивать сорт не только в основных, но и в пожнивных и поукосных посевах. Один из самых ранних сортов подсолнечника, адаптированный к возделыванию в условиях засухи

Урожайность в производственных посевах



- **Курская область** 27,8 ц/га
- **Орловская область** 28,1 ц/га
- **Липецкая область** 31,7 ц/га



ЮБИЛЯР®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

32 ц/га
потенциальная урожайность

Скороспелость и высокая продуктивность

Регион допуска
9, 10

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к условиям Западной Сибири и Урала


Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 45–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	77–83
Масличность, %	55
Высота растения, см	145
Устойчивость к заразихе	А–Е

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз



Гниль корзинок



Особенности

Выравнен по цветению и созреванию. Устойчив к полеганию. Характеризуется повышенной масличностью семян. Успешно вызревает без применения десикации

Урожайность в производственных посевах



- **Новосибирская область** 31,3 ц/га
- **Омская область** 30,0 ц/га
- **Алтайский край** 29,8 ц/га



БУЗУЛУК®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

35 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность

Регион допуска
5, 6, 9, 10

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая стабильность при засухе и в благоприятных условиях

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	84–86
Масличность, %	53
Высота растения, см	180
Устойчивость к заразихе	А–Е

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы. Высокая толерантность к основным болезням

Урожайность в производственных посевах



- **Воронежская область** 32,4 ц/га
- **Липецкая область** 31,2 ц/га
- **Краснодарский край** 34,1 ц/га



БУЗУЛУК СУР

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

37 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчив к сульфонилмочевиновым гербицидам (д.в. трибенурон-метил)

Регион допуска
5, 6, 9, 10

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Выравнен по высоте растений, цветению и созреванию

Предназначен для выращивания в производственных системах с использованием сульфонилмочевиновых гербицидов. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 50–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	84–86
Масличность, %	53
Высота растения, см	165
Устойчивость к заразихе	А–Е

Особенности


Отличается высокой полевой устойчивостью к фузариозу и сухой гнили. Высокоустойчив к полеганию

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз



Гниль корзинок



Урожайность в производственных посевах



● **Оренбургская область**
36,7 ц/га

● **Орловская область**
35,3 ц/га

● **Тамбовская область**
35,1 ц/га



КРУИЗ

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

34 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание олеиновой кислоты

Регион допуска
6

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Содержание олеиновой кислоты более 85 %

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	88–91
Масличность, %	50
Высота растения, см	180
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Характеризуется повышенной отзывчивостью на высокий агрофон. Отличается высокой толерантностью к фомопсису и гнилям

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 31,5 ц/га
- **Ростовская область** 30,1 ц/га
- **Ставропольский край** 29,7 ц/га



УСПЕХ®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

35 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность и масличность

Регион допуска
9, 10

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая засухоустойчивость, отзывчивость на высокий агрофон


Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 45–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	85–89
Масличность, %	56
Высота растения, см	160
Устойчивость к заразихе	А–Е

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз



Гниль корзинок



Особенности

Экологически пластичный сорт, отзывчив на высокий агрофон. Отличается высокой урожайностью

Урожайность в производственных посевах



- **Омская область** 34,6 ц/га
- **Курганская область** 34,1 ц/га
- **Республика Башкортостан** 30,1 ц/га



ВАРЯГ®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

43 ц/га
потенциальная урожайность

Стабильная урожайность

Регион допуска
9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая технологичность, отзывчивость на высокий агрофон


Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 45–55 тыс. раст/га

Характеристики


Вегетационный период, сут.	87–90
Масличность, %	53
Высота растения, см	160
Устойчивость к заразихе	A–E

Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фомопсис




Ржавчина



Фузариоз



Гниль корзинок



Особенности

Экологически пластичный сорт, толерантный к основным болезням

Урожайность в производственных посевах



- **Омская область** 34,0 ц/га
- **Курганская область** 33,3 ц/га
- **Алтайский край** 32,1 ц/га



УМНИК®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

43 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенная холодостойкость на ранних этапах развития

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Экологическая пластичность, высокая масличность

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	86–90
Масличность, %	54
Высота растения, см	200
Устойчивость к заразихе	A–F

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Высокопродуктивный сорт с улучшенными морфометрическими признаками. Устойчив к полеганию, отзывчив на высокий агрофон

Урожайность в производственных посевах



- **Ростовская область** 39,7 ц/га
- **Краснодарский край** 41,1 ц/га
- **Белгородская область** 43,0 ц/га



ДОНСКОЙ 95

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

43 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к семи расам заразихи (A–G)

Регион испытания
6, 8

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Стабильность по урожайности

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	100–105
Масличность, %	47
Высота растения, см	200
Устойчивость к заразихе	A–G

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9


Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Отзывчив на высокий агрофон, обладает высокой степенью адаптивности к условиям выращивания

Урожайность в экологическом сортоиспытании



- **Ростовская область**
  31,1 ц/га
- **Курская область**
  29,1 ц/га



МАСТЕР®

МАСЛИЧНЫЙ СОРТ

43 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая масличность семян

Регион допуска
6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая продуктивность, экологическая пластичность

Предназначен для выращивания по классической технологии. Оптимальная густота стояния подсолнечника к уборке 55–60 тыс. раст/га

Характеристики

Вегетационный период, сут.	94–96
Масличность, %	55
Высота растения, см	220
Устойчивость к заразихе	A–F

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Ржавчина

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Особенности

Высокотолерантен к основным болезням, устойчив к комплексу рас заразихи (A–F). Устойчив к полеганию, отличается повышенной масличностью семян

Урожайность в производственных посевах



- **Краснодарский край** 42,3 ц/га
- **Республика Адыгея** 42,1 ц/га
- **Чеченская Республика** 40,1 ц/га



БЕЛОСНЕЖНЫЙ®

700 ц/га
потенциальный урожай зелёной массы

Сорт силосного направления

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Поздняя

Преимущества
Гарант получения сочных кормов. Более высокий урожай зелёной массы на силос по сравнению с кукурузой, высокое содержание сахаров

Предназначен для выращивания по классической технологии

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса
1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомопсис
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Ржавчина
1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз
1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Гниль корзинок
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	110–120
Масличность, %	35
Высота растения, см	400

Особенности

Предназначен для выращивания на силос в регионах, где кукуруза уступает подсолнечнику по урожайности зелёной массы. Отличается высоким содержанием сахаров в зелёной массе. Быстрый рост растений на начальных этапах способствует эффективному подавлению сорняков

Урожай зелёной массы в производственных посевах



- **Алтайский край** 550,0 ц/га
- **Удмуртская Республика** 700,0 ц/га
- **Республика Башкортостан** 400,0 ц/га



СОЯ

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



БАРГУЗИН®

СОЯ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенная заморозкоустойчивость (до минус 5 °С)

Регион допуска
5, 6, 7, 9, 11

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Повышенная холодо- и заморозкоустойчивость, способность формировать рентабельную урожайность в длиннодневных условиях Восточной Сибири даже на многолетнемерзлотных почвах

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
1

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	110 (52°)
Содержание белка, %	41
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	130
Высота растения, см	85–100
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

От всходов до формирования бобов растения выдерживают ранневесенние заморозки до минус 5 °С в южных регионах РФ и летние заморозки на северных границах возделывания сои. Отличается пониженной реакцией на неоптимальную длину дня. В южных регионах созревает до наступления пиков позднелетних засух

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 3, 4, 8, 10, 12



ВИТА®

СОЯ

36 ц/га
потенциальная урожайность

Раннеспелость и засухоустойчивость

Регион допуска
5, 6, 8, 10, 12

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Пригодность к повторным летним посевам на юге России на фоне укорачивающихся длин дня

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	100 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	150
Высота растения, см	80–90
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Благодаря короткому вегетационному периоду сорт способен «уходить» от засух второй половины лета. В Краснодарском крае созревает в I–II декадах августа. Устойчив к полеганию и растрескиванию бобов

Урожайность в производственных посевах



- **Воронежская область** 27,6 ц/га
- **Ростовская область** 28,6 ц/га
- **Липецкая область** 31,0 ц/га
- **Волгоградская область** 29,2 ц/га

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ЗАБАВА®

СОЯ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Холодо- и засухоустойчивость

Регион испытания
5, 6, 7, 9

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Повышенная устойчивость к пониженным температурам воздуха и почвы в фазе всходов и повышенная урожайность в длиннодневных условиях

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	110 (52°)
Содержание белка, %	40
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	145
Высота растения, см	70–85
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Повышенная холодо- и заморозкоустойчивость (до минус 5 °С) позволяет высевать сорт в более ранние сроки во всех регионах внедрения. За счёт короткого вегетационного периода и пониженной реакции на длину дня сорт пригоден для повторных летних посевов в южных регионах РФ после уборки озимых колосовых без существенной потери высоты растений

Урожайность в экологическом сортоиспытании



Дополнительные зоны возможного возделывания 3, 4, 12



ЛИПЧАНКА

СОЯ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенная холодостойкость

Регион испытания
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Повышенная холодоустойчивость и пониженная реакция на длину дня, короткий вегетационный период

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	105 (52°)
Содержание белка, %	41
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	160
Высота растения, см	75–85
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Очень ранний тип, но при выращивании его в 3, 4, 5, 7, 9 и 10 регионах допуска время созревания изменится до среднего в южной и до позднего – в северной части зон соеводства этих регионов. Пригоден для повторных летних посевов в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах допуска после уборки озимых колосовых без существенной потери высоты растений

Урожайность в экологическом сортоиспытании



Дополнительные зоны возможного возделывания 11, 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ЛИРА®

СОЯ

35 ц/га
потенциальная урожайность

Раннеспелость и засухоустойчивость

Регион допуска
5, 6, 8

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Высокая устойчивость к ложной мучнистой росе, раку стеблей и пепельной гнили

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	100 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	140
Высота растения, см	75–85
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–14

Особенности

Короткий вегетационный период позволяет сорту формировать урожай до наступления засух во второй половине лета. В Краснодарском крае созревает в I–II декадах августа. Толерантен к стрессовым факторам. Устойчив к полеганию

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 12



ПУМА®

СОЯ

36 ц/га
потенциальная урожайность

Раннеспелость и засухоустойчивость

Регион допуска
5, 6

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Устойчивость к полеганию растений и растрескиванию бобов, короткий вегетационный период

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Характеристики

Вегетационный период, сут.	100 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	150
Высота растения, см	75–95
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Благодаря короткому вегетационному периоду сорт способен «уходить» от засух второй половины лета и формировать урожай до пиков позднелетних засух. Пригоден для возделывания на зерно в основных посевах на широтах до 50–52°

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 8, 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



САЯНА®

СОЯ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенная заморозкоустойчивость (до минус 5 °С)

Регион допуска
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Сверхранние сроки посева, холодоустойчивость (до минус 5 °С)

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	110 (52°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	150
Высота растения, см	85–105
Высота прикрепления нижнего боба, см	12–15

Особенности

Северный экотип. Повышенная урожайность в длиннодневных условиях недостаточного теплоснабжения и холодового стресса, устойчивость к пониженным температурам воздуха и почвы в фазе всходов. Пониженная реакция на длину дня позволяет выращивать сорт при поздних сроках посева (конец мая – начало июня)

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 3, 4, 9, 10, 11, 12



ВИГА®

СОЯ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Холодоустойчивость

Регион допуска
6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Устойчивость к растрескиванию бобов и полеганию при созревании, высокое прикрепление нижнего боба

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	108 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	180
Высота растения, см	90–110
Высота прикрепления нижнего боба, см	12–15

Особенности

При оптимальных сроках посева в условиях Краснодарского края созревает во II–III декадах августа. Толерантен к стрессовым факторам. Сорт среднерослый, семена жёлтого цвета, среднего размера, с желтым рубчиком

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ГРЕЯ®

СОЯ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание белка

Регион допуска
8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая урожайность в оптимальных по увлажнению условиях

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	117 (45°)
Содержание белка, %	46
Масличность, %	18
Масса 1000 семян, г	165
Высота растения, см	85–100
Высота прикрепления нижнего боба, см	12–15

Особенности

Интенсивный тип с высокой отзывчивостью на дополнительное увлажнение. На географических широтах 45 ± 2° ранний, с содержанием белка в семенах до 46 %. В засушливых условиях при снижении урожайности содержание белка в семенах может возрасти до 47–48 %

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 6



ИРБИС®

СОЯ

45 ц/га
потенциальная урожайность

Заморозкоустойчивость (до минус 5 °С), фотонейтральность

Регион допуска
5, 6

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокое содержание белка в семенах, высокая урожайность, устойчивость к стрессовым условиям

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	112 (45°)
Содержание белка, %	46
Масличность, %	21
Масса 1000 семян, г	175
Высота растения, см	95–115
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Высокотехнологичный сорт, устойчивый к засухе, холоду. В фазе всходов выдерживает заморозки на почве до минус 5 °С. Слабо реагирует на укороченные длины дня, пригоден для очень ранних посевов — на месяц раньше оптимальных сроков

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 8, 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



КОРА®

СОЯ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Раннеспелость и засухоустойчивость

Регион допуска
6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокобелковый сорт, непродолжительный вегетационный период, устойчивость к полеганию и растрескиванию бобов

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	110 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	180
Высота растения, см	90–95
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–14

Особенности

Семена имеют плотную семенную оболочку, что снижает их травмирование при уборке. Непродолжительный вегетационный период позволяет получать семена без искусственной досушки и своевременно готовить почву под посев озимых колосовых культур

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 12



ЛЮБАВА®

СОЯ

44 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к засухе и холоду

Регион допуска
6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Повышенная засухоустойчивость за счёт глубокой корневой системы (до 2,2–2,4 м), отзывчивость на улучшение влагообеспеченности

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	114 (45°)
Содержание белка, %	40
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	140
Высота растения, см	90–115
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Высокорослый сорт, обладает повышенной для своей группы созревания урожайностью. За счёт пониженной фотопериодической чувствительности пригоден для повторных летних посевов после уборки озимых колосовых культур без существенного снижения высоты растений

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ОЛИМПИЯ®

СОЯ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая отзывчивость на орошение

Регион допуска
5, 6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Устойчивость к полеганию и растрескиванию бобов при созревании, устойчивость к ложной мучнистой росе и пепельной гнили, отзывчив на орошение

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	115 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	160
Высота растения, см	80–90
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Сорт формирует рентабельные урожаи зерна в засушливые годы. В Краснодарском крае при оптимальных сроках посева созревает в конце августа. Высокотехнологичный сорт

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 12



ПАРУС®

СОЯ

38 ц/га
потенциальная урожайность

Раннее созревание, высокорослость

Регион допуска
5, 6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Непродолжительный вегетационный период, засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	105 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	170
Высота растения, см	105–115
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Короткий вегетационный период позволяет получать семена без искусственной досушки и своевременно готовить почву под посев озимых колосовых культур. При оптимальных сроках посева в условиях Краснодарского края созревает во II–III декадах августа. Растения устойчивы к полеганию и растрескиванию бобов

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



СЕЛЕНА®

СОЯ

42 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенная засухоустойчивость

Регион допуска
6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Устойчивость к полеганию и растрескиванию бобов при перестое на корню, отзывчивость на высокий агрофон и орошение

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	110 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	140
Высота растения, см	95–105
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Засухоустойчивость сорта определяется способностью забора из почвы насыщенных почвенных растворов, недоступных другим сортам.Тип развития куста от полудетерминантного до индетерминантного. Во влажные годы и на более высоких географических широтах высота растений может достигать 110–120 см

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 12



СЛАВИЯ®

СОЯ

42 ц/га
потенциальная урожайность

Сверхранние сроки посева, заморозкоустойчивость (до минус 5 °С)

Регион допуска
5, 6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Холодоустойчивость, способность выдерживать неоднократные ранневесенние заморозки

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	110 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	155
Высота растения, см	110–125
Высота прикрепления нижнего боба, см	15–16


Особенности

Всходы выдерживают кратковременные заморозки до минус 4,5–5,0 °С. Засухоустойчивый сорт с очень глубокой корневой системой и центральным корнем до 2,5 м. В Краснодарском крае созревает в III декаде августа – I декаде сентября. В южно-предгорной и центральной зонах региона может высеваться с конца марта – начала апреля. При очень ранних сроках посева (конец марта – начало апреля) созревает в I декаде августа

Урожайность в производственных посевах



Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ТРИАДА®

СОЯ

45 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность, засухоустойчивость, холодоустойчивость

Регион допуска
8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Оптимальное соотношение таких признаков, как холодо-, засухоустойчивость, пониженная реакция на длину дня

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	113 (45°)
Содержание белка, %	41
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	170
Высота растения, см	100–115
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Сорт пригоден для сверхранних сроков посева — на 3–4 недели ранее оптимальных. Предназначен для выращивания в засушливых регионах юга России, а также в зонах с развитыми системами орошения в центральных и южных частях Казахстана, по всей территории Узбекистана и Киргизии на 40–50° северной широты

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 6



ЧАРА®

СОЯ

41 ц/га
потенциальная урожайность

Засухоустойчивость и отзывчивость на орошение

Регион допуска
6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая технологичность, устойчивость к полеганию и растрескиванию бобов при созревании

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	115 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	160
Высота растения, см	110–125
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

В Краснодарском крае при оптимальных сроках посева созревает в конце августа. Формирует рентабельные урожаи зерна в засушливые годы. Устойчив к ложной мучнистой росе и пепельной гнили

Урожайность в производственных посевах



Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ЕЛИСЕЙ®

СОЯ

45 ц/га
потенциальная урожайность

Слабая реакция на длину дня

Регион допуска
6, 8

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Повышенная засухоустойчивость, повышенная холодо- и заморозкоустойчивость

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	118 (45°)
Содержание белка, %	41
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	158
Высота растения, см	105–120
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Высокорослый сорт с глубокой корневой системой (до 2,5–2,7 м). Высокоотзывчив на улучшение влагообеспеченности. Пониженная реакция на укороченную длину дня. В Краснодарском крае пригоден для очень ранних (конец марта – начало апреля) сроков посева

Урожайность в производственных посевах





РЫСЬ

СОЯ

45 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к засухе и холоду

Регион допуска
6

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Отзывчивость на дополнительное увлажнение, повышенная устойчивость к наклону и полеганию растений при избыточном увлажнении

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	120 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	180
Высота растения, см	95–105
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Среднеранний полудетерминантный и крупносемянный сорт с повышенной холодо- и заморозкоустойчивостью (до минус 5 °С) и пониженной реакцией на длину дня. На дополнительное увлажнение отзывается увеличением крупности и массы семян

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Краснодарский край**
43,0 ц/га

Дополнительные зоны возможного возделывания 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



СЕБУР

СОЯ

45 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность

Регион допуска
6

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Повышенная устойчивость к наклону и полеганию, крупные семена, высокое содержание белка

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	115 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	180
Высота растения, см	110–120
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

На дополнительное увлажнение сорт отзывается увеличением высоты растений, количества узлов, бобов и семян, массой семян, урожайностью. Высокорослые растения устойчивы к наклону и полеганию за счёт механической прочности стебля

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Краснодарский край**
45,0 ц/га

Дополнительные зоны возможного возделывания 8, 12



БАРС®

СОЯ

50 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание белка, заморозкоустойчивость (до минус 5 °С)

Регион допуска
6, 8, 12

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Повышенная для своей группы спелости урожайность, засухоустойчивость, сверхранние сроки посева

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	115 (45°)
Содержание белка, %	45
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	185
Высота растения, см	90–110
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Сорт характеризуется холодоустойчивостью (до минус 5 °С), более глубокой корневой системой. Помимо указанных регионов допуска пригоден для возделывания в областях с развитыми системами орошения в центральной и южной частях Казахстана на 44–50° северной широты, а также всей территории Узбекистана и Киргизии

Урожайность в производственных посевах



Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ВЕСТОЧКА®

СОЯ

53 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое прикрепление нижнего боба

Регион допуска
6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Засухоустойчивость, стабильная урожайность в зонах с недостаточным увлажнением

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	120 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	170
Высота растения, см	110–125
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Высокопродуктивный технологичный сорт для возделывания на зерно в основных посевах. Формирует рентабельные урожаи в засушливые годы. Высокое прикрепление нижнего боба препятствует потере урожайности при уборке. В Краснодарском крае созревает в I–III декадах сентября

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 8



ВИЛАНА®

СОЯ

57 ц/га
потенциальная урожайность

Отзывчивость на высокий агрофон и орошение

Регион допуска
6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая отзывчивость на улучшение условий выращивания. В оптимальных условиях возделывания формирует высокие урожаи семян гетерозисного уровня

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	125 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	160
Высота растения, см	100–115
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

В Краснодарском крае при оптимальных сроках посева созревает в середине сентября. Устойчив к ложной мучнистой росе и пепельной гнили. Оптимален для богарного возделывания в предгорной зоне Северного Кавказа

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 8

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ВИЛАНА БЕТА®

СОЯ

57 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая устойчивость к загущению, засорению и подтоплению

Регион допуска
6, 8

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Выносливость к избыточной густоте стояния и затенению культурными и сорными растениями, способность выдерживать подтопление до одного месяца

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	125 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	160
Высота растения, см	110–120
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Благодаря повышенному содержанию хлорофилла β отличается повышенной выносливостью к длительному подтоплению и гипоксии корневой системы. Сорт пригоден для выращивания по безгербицидной (органической) технологии с целью получения органической продукции. Выдерживает загущение растений свыше 700 тыс. шт/га

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 12



ЗАРА®

СОЯ

52 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к засухе и холоду

Регион допуска
6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Сверхранние сроки посева, холодоустойчивость до минус 5 °С, слабая реакция на длину дня

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	115 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	170
Высота растения, см	100–125
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Высокорослый сорт, адаптирован к возделыванию в заслушливых условиях. Устойчив к полеганию и растрескиванию бобов при перестое. Высокотехнологичен. Созревает в условиях Краснодарского края в I–III декадах сентября

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 8, 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ИНЕЙ®

СОЯ

50 ц/га
потенциальная урожайность

Холодоустойчивость (до минус 5 °С)

Регион допуска
6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Сверхранние сроки посева — на 3–4 недели ранее оптимальных сроков, засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к растрескиванию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Аскохитоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериальная пятнистость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пепельная гниль

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	112 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	175
Высота растения, см	110–120
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Обладает высокой устойчивостью к пониженным температурам воздуха и почвы, а также повышенной урожайностью в засушливых условиях. Глубина проникновения центрального корня в почву достигает 2,1–2,4 м, что обеспечивает растениям повышенную засухоустойчивость при пересыхании верхних горизонтов почвы

Урожайность в производственных посевах



Дополнительные зоны возможного возделывания 8, 12



МАМОНТ®

СОЯ

58 ц/га
потенциальная урожайность


Очень высокорослый сорт с признаками гигантизма

Регион испытания
6


Группа спелости
Средняя

Преимущества
Повышенная отзывчивость на увлажнение, глубокая корневая система, высокорослость (до 180 см)

Устойчивость к полеганию




Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса




Фузариоз




Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут.	124 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	190
Высота растения, см	135–180
Высота прикрепления нижнего боба, см	16–19

Особенности

На дополнительные осадки или орошение сорт отзывается увеличением высоты растений до сверхвысокой, количества узлов на главном и боковых побегах, бобов и семян, крупности и массы семян. Повышенная устойчивость к наклону и полеганию при избыточном увлажнении достигается за счёт механической упругости и прочности стебля

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Краснодарский край**
58,0 ц/га

Дополнительные зоны возможного возделывания 12

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг



ЯГУАР

СОЯ

50 ц/га
потенциальная урожайность


Ускоренное формирование надземной биомассы

Регион испытания
6, 8


Группа спелости
Средняя

Преимущества
Повышенная устойчивость высокорослых растений к наклону и полеганию при избыточном увлажнении

Устойчивость к полеганию




Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса




Фузариоз




Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут.	123 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	170
Высота растения, см	130–160
Высота прикрепления нижнего боба, см	16–18

Особенности

На дополнительное увлажнение сорт реагирует увеличением высоты растений, количества узлов, бобов и семян, массы семян, урожайности. Повышенная устойчивость к наклону и полеганию при избыточном увлажнении достигается за счёт механической упругости и прочности стебля

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Краснодарский край**
46,8 ц/га на орошении

Дополнительные зоны возможного возделывания 12



МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН



СВЕТЛЯЧОК®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

20 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность

Регион допуска
4, 5, 6, 8

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая отзывчивость на высокий агрофон, технологичность при возделывании

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Антракноз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Характеристики

Вегетационный период, сут.	75
Масличность, %	51
Масса 1000 семян, г	8,0
Высота растения, см	55

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и засухоустойчивости. Благодаря светлой окраске семян и высокой масличности возможно применение в кондитерской промышленности и хлебопечении

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
19,2 ц/га



СЕВЕРНЫЙ 22®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

25 ц/га
потенциальная урожайность

Пригоден для выращивания в Сибири


Регион допуска
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Ранняя


Преимущества
Высокая степень адаптивности к почвенно-климатическим условиям Сибири, холодоустойчивость, высокая стабильность урожайности

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Устойчивость к засухе




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	90
Масличность, %	51
Масса 1000 семян, г	8,5
Высота растения, см	55

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Технологичный сорт, демонстрирующий хорошую стабильность урожая. Высокоустойчив к фузариозу, полеганию и осыпанию

Урожайность в производственных посевах



● **Омская область**
25,0 ц/га



АВАНГАРД®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

28 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к засухе и холоду


Регион допуска
4, 5, 6, 8, 9

Группа спелости
Средняя


Преимущества
Высокая урожайность и сбор масла с гектара, экологическая пластичность в контрастных условиях

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Устойчивость к засухе




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	95
Масличность, %	51
Масса 1000 семян, г	7,5
Высота растения, см	70

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Сорт создан по классической технологии на повышение урожайности в различных условиях выращивания, засухоустойчив. Отличается дружным цветением и созреванием

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
28,0 ц/га

● **Липецкая область**
24,7 ц/га



АВГУСТ®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

27 ц/га
потенциальная урожайность

Очень высокая устойчивость к фузариозу

Регион допуска
4, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая масличность, пластичность к срокам посева, выравненность по высоте, цветению и созреванию растений

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Антракноз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	90
Масличность, %	53
Масса 1000 семян, г	8,1
Высота растения, см	70

Цвет семян

Цвет лепестков

Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и засухоустойчивости. Сорт отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы. Обладает очень высокой устойчивостью к осыпанию и полеганию

Урожайность в производственных посевах



● **Оренбургская область**
26,1 ц/га

● **Ульяновская область**
24,7 ц/га



АМБЕР®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

28 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность

Регион допуска
4, 9, 10

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая засухоустойчивость, стабильность в стрессовых условиях, отзывчивость на высокий агрофон

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Антракноз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95
Масличность, %	47
Масса 1000 семян, г	6,0
Высота растения, см	75

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Благодаря низкому содержание линоленовой кислоты в масле семян от 4,8 до 6,3 % пригоден для изготовления высококачественного пищевого масла. Отличается дружным созреванием, устойчив к фузариозу, полеганию и осыпанию

Урожайность в производственных посевах



● **Республика Башкортостан**
27,2 ц/га



БАРХАН®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

30 ц/га
потенциальная урожайность

Очень высокая устойчивость к засухе


Регион допуска
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя


Преимущества
Устойчивость к полеганию, двойное назначение использования сорта: на масло и волокно

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Устойчивость к засухе




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	90
Масличность, %	48
Масса 1000 семян, г	6,4
Высота растения, см	60

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и засухоустойчивости. Характеризуется дружным цветением и созреванием, высокой устойчивостью к полеганию, осыпанию семян

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Волгоградская область**
25,6 ц/га



БИРЮЗА®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

26 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность

Регион допуска
9, 10

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая масличность, стабильность результатов в контрастных условиях, засухоустойчивость

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Антракноз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	90
Масличность, %	51
Масса 1000 семян, г	6,7
Высота растения, см	70

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и засухоустойчивости. Содержание линоленовой кислоты в масле более 60 %. Сорт пригоден для двойного использования: на техническое масло и волокно. Отзывчив на высокий агрофон. Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям

Урожайность в производственных посевах



● **Алтайский край**
23,1 ц/га



ВНИИМК 620 ФН®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

27 ц/га
потенциальная урожайность

Отсутствие реакции на изменение длины дня

Регион допуска
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Устойчивость к недостатку влаги в почве, высокая устойчивость к фузариозу, экологическая пластичность

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Антракноз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	50
Масса 1000 семян, г	6,8
Высота растения, см	68

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Сорт характеризуется дружностью цветения и созревания, высокой устойчивостью к полеганию и обладает хорошей приспособленностью к механизированной уборке. Пригоден для двойного использования: на техническое масло и волокно. Хорошо адаптирован к умеренным стрессам. Отличная отзывчивость на высокий фон минерального питания

Урожайность в производственных посевах



● **Республика Татарстан**
27,0 ц/га



ДАНИК®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

27 ц/га
потенциальная урожайность

Максимальная адаптивность к любым условиям выращивания

Регион допуска
5, 6, 9, 10

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая урожайность, масличность, повышенная устойчивость засухе и полеганию

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Антракноз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	51
Масса 1000 семян, г	7,5
Высота растения, см	75

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Сорт характеризуется дружностью цветения и созревания. Высокое содержание масла в семенах и высота растений 70 см и выше позволяют использовать его как сорт двойного назначения – на масло и волокно. Отличается повышенной устойчивостью к полеганию и засухе. Отзывчив на высокий агрофон

Урожайность в производственных посевах



● **Республика Крым**
25,1 ц/га



НЕБЕСНЫЙ®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

25 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность

Регион допуска
4, 6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая степень адаптации к природным условиям возделывания, стабильность в стрессовых условиях

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Антракноз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	90
Масличность, %	49
Масса 1000 семян, г	8,0
Высота растения, см	85

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и засухоустойчивости. Технологичен при возделывании. Высокоустойчив к фузариозному увяданию, устойчив к полеганию. Отзывчив на высокий агрофон

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
21,3 ц/га



НИЛИН®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

21 ц/га
потенциальная урожайность

Изменённый жирно-кислотный состав масла

Регион допуска
4, 5, 6, 7, 10

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Масло сорта – альтернатива подсолнечному. Высокая окситабильность за счет низкого содержания линоленовой кислоты в масле 2,9 %

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Антракноз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	90
Масличность, %	46
Масса 1000 семян, г	5,3
Высота растения, см	85

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Низкое содержание линоленовой кислоты в масле (2,9 % против 68 % у сорта-стандарта), повышенная окситабильность предопределяет его использование на пищевые цели. Масло сорта является альтернативой подсолнечному, т.к. его можно выращивать в регионах, где не растет подсолнечник. Сорт быстро развивается на ранних этапах вегетации

Урожайность в производственных посевах



● **Ставропольский край**
20,7 ц/га



РАДУГА®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

25 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая масличность


Регион допуска
4, 5, 6, 8

Группа спелости
Средняя


Преимущества
Устойчивость к недостатку влаги в почве, высокая степень адаптации к природным условиям возделывания

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Устойчивость к засухе




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	50
Масса 1000 семян, г	8,0
Высота растения, см	75

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и засухоустойчивости. Сорт не реагирует на изменение длины дня, отличается высокой продуктивностью, стабильностью в стрессовых условиях, устойчивостью к полеганию

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
24,6 ц/га



РУЧЕЁК®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

25 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к засухе


Регион допуска
4, 6, 7, 8

Группа спелости
Средняя


Преимущества
Высокая отзывчивость на высокий агрофон, технологичность при возделывании

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Устойчивость к засухе




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	50
Масса 1000 семян, г	6,4
Высота растения, см	66

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Создан по классической технологии на повышение урожайности и засухоустойчивости. Отзывчив на высокий агрофон. Отличается дружным цветением и созреванием

Урожайность в производственных посевах



● **Ставропольский край**
23,6 ц/га



РФН®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

27 ц/га
потенциальная урожайность

Пониженная реакция на изменение длины дня


Регион допуска
4, 5, 10

Группа спелости
Средняя


Преимущества
Высокая продуктивность, масличность. Двойное назначение сорта: на масло и волокно

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Устойчивость к засухе




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	50
Масса 1000 семян, г	6,5
Высота растения, см	65

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям, устойчив к недостатку влаги в почве. Не реагирует на изменение длины дня, демонстрирует стабильность в стрессовых условиях

Урожайность в производственных посевах



● **Липецкая область**
27,0 ц/га



САНИЯ®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

24 ц/га
потенциальная урожайность

Очень высокая масличность семян

Регион допуска
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к различным почвенно-климатическим условиям, высокая стабильность урожайности в засушливых условиях

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Антракноз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95
Масличность, %	54
Масса 1000 семян, г	9,0
Высота растения, см	65

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Благодаря высокому содержанию линоленовой кислоты в масле 58–61 % позволяет получать высококачественное техническое масло. Сорт хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям Сибири

Урожайность в производственных посевах





СНЕГУРОК®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

27 ц/га
потенциальная урожайность

Зимующий сорт, сорт-двуручка

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Морозостойкость до минус 20–23 °С, пониженная чувствительность к укороченным ранневесенним длинам дня

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Антракноз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	240/85
Масличность, %	43
Масса 1000 семян, г	6,2
Высота растения, см	78

Цвет семян




Цвет лепестков



Особенности

Первый в мире зимующий сорт масличного льна, пригоден для посева в осенние сроки в южных и центральных регионах европейской части России. Посев осуществляется в осенний период (конец сентября – середина октября) для получения растений высотой 5–10 см (фаза «ёлочки») до наступления зимнего периода. Сорт также пригоден для весеннего посева

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край*** 24,0 ц/га

● **Ставропольский край*** 21,2 ц/га

* – при посеве осенью



ФИАНИТ

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

30 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность

Регион испытания
5, 6, 7, 8

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к различным почвенно-климатическим условиям, высокая устойчивость к болезням

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Антракноз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95
Масличность, %	50
Масса 1000 семян, г	7,8
Высота растения, см	70

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Сорт предназначен для производства высококачественного масла и волокна, приспособлен к механизированной уборке. Отзывчив на высокий агрофон. Отличается дружным цветением и созреванием

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Ставропольский край**
20,0 ц/га



ФЛИЗ®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

27 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность


Регион допуска
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Группа спелости
Средняя


Преимущества
Стабильная и максимальная урожайность в любых условиях выращивания, экологическая пластичность

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Устойчивость к засухе




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	51
Масса 1000 семян, г	8,0
Высота растения, см	73

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Пригоден для двойного использования: на техническое масло и волокно. Отзывчив на высокий агрофон. Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям, устойчив к недостатку влаги в почве

Урожайность в производственных посевах



● **Волгоградская область**
26,2 ц/га



ФЛИЗ ЗУ®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

28 ц/га
потенциальная урожайность

Полная устойчивость к засухе

Регион допуска
3, 4, 5, 6, 8, 9, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к различным почвенно-климатическим условиям, повышенная урожайность

Оптимальная густота стояния находится в диапазоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Антракноз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	48
Масса 1000 семян, г	7,7
Высота растения, см	62

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Засухоустойчивость сорта определяется более глубокой корневой системой. Сорт пригоден для изготовления масла и волокна. Отличается дружным цветением и созреванием

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Волгоградская область**
20,0 ц/га

● **Краснодарский край**
24,0 ц/га



Ы 117®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

25 ц/га
потенциальная урожайность

Полная устойчивость ко льноутомлению и фузариозному увяданию

Регион допуска
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Пригоден для выращивания в короткоротационных севооборотах (3–4 поля) и при монокультуре, в том числе в засушливых регионах

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Антракноз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	43
Масса 1000 семян, г	5,3
Высота растения, см	75

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Первый в мире сорт масличного льна с полной устойчивостью ко льноутомлению и высокой полевой устойчивостью к фузариозному увяданию. Отличается пониженным содержанием линоленовой кислоты в масле, обеспечивающим устойчивость масла к окислению. Подходит для пищевых целей

Урожайность в производственных посевах




● **Ставропольский край**
27,1 ц/га

● **Республика Татарстан**
27,7 ц/га

ВНИИМК

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН



ЫЛ 220®

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

28 ц/га
потенциальная урожайность

Полная устойчивость ко льноутомлению и фузариозному увяданию

Регион допуска
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Пригоден для выращивания в короткоротационных севооборотах (3–4 поля) и при монокультуре, в том числе в засушливых регионах

Оптимальная густота стояния находится в диапозоне 600–900 шт/м² в зависимости от региональных рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к засухе

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Антракноз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Полиспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Бактериоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	45
Масса 1000 семян, г	6,0
Высота растения, см	75

Цвет семян



Цвет лепестков



Особенности

Сорт масличного льна с полной устойчивостью ко льноутомлению и высокой полевой устойчивостью к фузариозному увяданию. Отличается пониженным содержанием линоленовой кислоты в масле, обеспечивающим устойчивость масла к окислению. Подходит для пищевых целей

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
25,0 ц/га

● **Ивановская область**
20,1 ц/га



РАПС



ТАВРИОН®

РАПС ЯРОВОЙ

34 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к высоким температурам и недостатку влаги

Регион допуска
2, 3, 4, 5, 6, 9

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность и стабильность

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	75–77
Масличность, %	49
Содержание белка, %	24
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	2,8–4,0
Урожай зелёной массы, т/га	30

Особенности

Безэруковый, низкоглюкозинолатный сорт. Хорошая адаптация к различным почвенно-климатическим условиям, толерантность к стрессам. Высокая устойчивость к полеганию

Урожайность в производственных посевах



● **Оренбургская область**
31,7 ц/га



АМУЛЕТ®

РАПС ЯРОВОЙ

32 ц/га
потенциальная урожайность

Первый отечественный высокоолеиновый сорт ярового рапса

Регион допуска
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокое содержание олеиновой кислоты (76–78 %) улучшает питательные и вкусовые качества масла, открывает новые возможности его использования

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	78–79
Масличность, %	48
Содержание белка, %	27
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–14
Масса 1000 семян, г	3,2–4,0
Урожай зелёной массы, т/га	30

Особенности

Высокоолеиновое рапсовое масло по свойствам близко к оливковому, характеризуется повышенной окси- и термостабильностью с оптимальным соотношением омега-3 и омега-6 жирных кислот

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
31,4 ц/га



ВИКИНГ-ВНИИМК®

РАПС ЯРОВОЙ

34 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность во многих регионах России


Регион допуска
6, 9

Группа спелости
Ранняя


Преимущества

Пониженное содержание линоленовой кислоты в составе триглицеридов позволяет получить более стойкое к окислению масло


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Засухоустойчивость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	77–79
Масличность, %	47
Содержание белка, %	26
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–14
Масса 1000 семян, г	3,1–4,5
Урожай зелёной массы, т/га	30

Особенности

Безэруковый, низкоглюкозинолатный сорт. Высокая устойчивость к полеганию. Рекомендуется для возделывания на семена, высокоадаптированный и технологичный сорт

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
31,3 ц/га



КЕНАР®

РАПС ЯРОВОЙ

30 ц/га
потенциальная урожайность

Жёлтая окраска семени

Регион допуска
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Рапсовое масло из семян жёлтого цвета обладает улучшенными органолептическими свойствами: более приятным запахом, вкусом, высокой степенью прозрачности

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	78–80
Масличность, %	47
Содержание белка, %	26
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	2,9–4,1
Урожай зелёной массы, т/га	28

Особенности

Сорт «000» типа. Шрот обладает более высокой кормовой ценностью, что позволяет значительно расширить возможности использования сорта на кормовые цели. Пониженное содержание лузги, клетчатки и других нежелательных органических веществ повышает качество шрота и увеличивает его долю в рационе животных и птиц

Урожайность в производственных посевах



● **Белгородская область**
27,8 ц/га



РУЯН®

РАПС ЯРОВОЙ

37 ц/га
потенциальная урожайность


Высокая продуктивность и урожайность

Регион допуска
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Урожайность сорта обусловлена его способностью формировать дополнительные стебли, что обеспечивает высокий урожай маслосемян и зелёной массы


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Засухоустойчивость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	77–80
Масличность, %	47
Содержание белка, %	26
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	2,6–3,9
Урожай зелёной массы, т/га	32

Особенности

Безэруковый, низкоглюкозинолатный сорт, показывает стабильные результаты в различных почвенно-климатических условиях. Зелёная масса характеризуется высоким содержанием сырого жира и каротина

Урожайность в производственных посевах



● **Республика Башкортостан**
33,1 ц/га



ЕРМАК®

РАПС ЯРОВОЙ

38 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая семенная и кормовая продуктивность

Регион допуска
1, 4, 7, 9, 10, 11

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Стабильная урожайность в сочетании с высоким качеством масла и шрота

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	76–82
Масличность, %	46
Содержание белка, %	24
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,5–3,6
Урожай зелёной массы, т/га	33


Особенности

Технологичный безэруковый сорт. Характеризуется высокой степенью адаптации к агроклиматическим условиям регионов европейской части России и Сибири. Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели

Урожайность в производственных посевах



● **Омская область**
34,3 ц/га



БАЛАНС

РАПС ЯРОВОЙ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность, повышенная крупность семян

Регион допуска
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Низкое содержание глюкозинолатов. Высокая урожайность, стабильно проявляющаяся в различных экологических и погодных условиях

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	80–82
Масличность, %	47
Содержание белка, %	24
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,1–4,3
Урожай зелёной массы, т/га	35

Особенности

Растения имеют повышенный коэффициент ветвистости. Сорт рекомендуется для возделывания на зерно

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Орловская область**
41,7 ц/га



ЯРИЛО®

РАПС ЯРОВОЙ

37 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность во многих регионах России

Регион допуска
4, 5, 7, 9, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высококачественные семена, устойчивость к основным болезням и вредителям

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	73–89
Масличность, %	43
Содержание белка, %	26
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–14
Масса 1000 семян, г	2,7–3,3
Урожай зелёной массы, т/га	27

Особенности

Высокоадаптивный сорт с хорошей семенной продуктивностью. Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели. Технологичный, пригодный к механизированной уборке

Урожайность в производственных посевах



● **Курская область**
35,6 ц/га



55 РЕГИОН®

РАПС ЯРОВОЙ

30 ц/га
потенциальная урожайность

Отзывчивость на высокий агрофон

Регион допуска
4, 7, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Устойчивость к полеганию, высокая экологическая пластичность и стабильность урожая

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	88–90
Масличность, %	53
Содержание белка, %	21
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	11–12
Масса 1000 семян, г	3,5–3,9
Урожай зелёной массы, т/га	30

Особенности

Адаптирован к условиям рапсосеющих регионов. Имеет высокие показатели продуктивности и масличности. Посевы выравнены по высоте. Масло и шрот, получаемые из семян данного сорта, соответствуют мировым стандартам качества

Урожайность в производственных посевах



● **Тюменская область**
27,8 ц/га



АРБАЛЕТ®

РАПС ЯРОВОЙ

36 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность с высоким качеством семян

Регион допуска
2, 3, 4, 5, 9, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Стабильная семенная продуктивность во многих регионах России, формирование семян с высоким качеством масла и шрота

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	82–92
Масличность, %	42
Содержание белка, %	24
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–17
Масса 1000 семян, г	2,8–3,7
Урожай зелёной массы, т/га	19

Особенности

Технологичный, пригодный к механизированной уборке сорт. Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели. Устойчив к полеганию и осыпанию семян

Урожайность в производственных посевах



● **Липецкая область**
34,8 ц/га



ГРАНИТ®

РАПС ЯРОВОЙ

30 ц/га
потенциальная урожайность


Отличное сочетание урожайности, масличности и скороспелости

Регион допуска
4, 9, 10, 11


Группа спелости
Средняя

Преимущества
Гарантированное получение масла и шрота, соответствующих мировым стандартам качества


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Засухоустойчивость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	84–87
Масличность, %	51
Содержание белка, %	23
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	12–13
Масса 1000 семян, г	3,2–3,8
Урожай зелёной массы, т/га	30

Особенности

Сорт имеет высокие показатели продуктивности и масличности. Посевы выравнены по высоте, адаптированы к условиям рапсосеющих регионов. Отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы, пригоден к механизированной уборке

Урожайность в производственных посевах



● Тюменская область
29,8 ц/га



РИФ®

РАПС ЯРОВОЙ

30 ц/га
потенциальная урожайность

Урожайность, высокое качество масла и семян

Регион допуска
2, 4, 5, 7, 9

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Технологичный сорт, рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	91–94
Масличность, %	44
Содержание белка, %	25
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	12–20
Масса 1000 семян, г	2,6–3,5
Урожай зелёной массы, т/га	24

Особенности

Коммерческая ценность сорта состоит в его способности обеспечивать стабильный урожай семян и зелёной массы в различных регионах России

Урожайность в производственных посевах



● **Липецкая область**
27,4 ц/га



СИБИРЯК 60®

РАПС ЯРОВОЙ

31 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая масличность

Регион допуска
4, 7, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая семенная продуктивность и низкое содержание глюкозинолатов в семенах

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	87–89
Масличность, %	52
Содержание белка, %	22
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	12–13
Масса 1000 семян, г	3,0–3,6
Урожай зелёной массы, т/га	31


Особенности

Гарантированное получение масла и шрота, соответствующих мировым стандартам качества

Урожайность в производственных посевах



● **Омская область**
28,7 ц/га



ТРИУМФ®

РАПС ЯРОВОЙ

39 ц/га
потенциальная урожайность


Короткий вегетационный период

Регион допуска
1 (на зелёный корм),
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая семенная продуктивность и качество семян, экологическая пластичность


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Засухоустойчивость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	86–100
Масличность, %	46
Содержание белка, %	25
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,3–4,1
Урожай зелёной массы, т/га	—

Особенности

Низкое содержание глюкозинолатов в семенах. Сорт рекомендуется для возделывания на семена. Пригоден к механизированной уборке

Урожайность в производственных посевах



● **Пензенская область**
38,9 ц/га



ФОРПОСТ КЛ®

РАПС ЯРОВОЙ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам

Регион допуска
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая продуктивность во многих регионах России, высококачественные семена

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	89–102
Масличность, %	46
Содержание белка, %	26
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,6–4,4
Урожай зелёной массы, т/га	38

Особенности

Экологически пластичный, безэруковый и низкоглюкозинолатный сорт. Высокотехнологичный, пригодный к механизированной уборке

Урожайность в производственных посевах



● **Республика Хакасия**
36,6 ц/га



ФЛАГМАН®

РАПС ЯРОВОЙ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая семенная продуктивность и масличность

Регион допуска
4, 6, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая урожайность, семена с высоким качеством масла и шрота

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	79–93
Масличность, %	42
Содержание белка, %	27
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	2,7–3,4
Урожай зелёной массы, т/га	27

Особенности

Высокое качество масла и семян, устойчивость к основным патогенам, технологичность возделывания и уборки. Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели. В средней степени повреждается крестоцветными блошками и рапсовым цветоедом

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
39,4 ц/га



ЭРЕБУС®

РАПС ЯРОВОЙ

41 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность и пластичность

Регион допуска
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Семена с высоким качеством масла и шрота

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 **4** 5 6 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	90–101
Масличность, %	46
Содержание белка, %	26
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,2–3,9
Урожай зелёной массы, т/га	28

Особенности

Высокотехнологичный безэруковый сорт, пригодный к механизированной уборке. Рекомендуется для возделывания на семена

Урожайность в производственных посевах



● **Томская область**
40,2 ц/га



ЮБИЛЕЙНЫЙ 23

РАПС ЯРОВОЙ

32 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание масла

Регион испытания
4, 7, 9, 10, 11

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Устойчивость к наиболее распространённым болезням (ложной мучнистой росе и склеротинозу), толерантность к альтернариозу

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	88–95
Масличность, %	53
Содержание белка, %	22
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–14
Масса 1000 семян, г	3,2–3,8
Урожай зелёной массы, т/га	32

Особенности

Безэруковый, низкоглюкозинолатный (тип «00») сорт. Рекомендуется для возделывания на семена

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Томская область**
29,7 ц/га



АНТАРЕС®

РАПС ЯРОВОЙ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность

Регион допуска
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Группа спелости
Среднепоздняя

Преимущества
Высокая семенная продуктивность, формирование семян с высоким качеством масла и шрота

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	78–99
Масличность, %	47
Содержание белка, %	26
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,2–3,8
Урожай зелёной массы, т/га	30

Особенности

Сорт «00» типа (безэруковый). Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели

Урожайность в производственных посевах



● **Пермский край**
38,7 ц/га



АРКТУР КЛ

РАПС ЯРОВОЙ

42 ц/га
потенциальная урожайность


Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам

Регион испытания
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Группа спелости
Среднепоздняя

Преимущества
Устойчивость к гербициду «Нопасаран» и его отечественным эквивалентам


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Засухоустойчивость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	89–103
Масличность, %	44
Содержание белка, %	24
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–15
Масса 1000 семян, г	2,8–4,0
Урожай зелёной массы, т/га	35

Особенности

Безэруковый, низкоглюкозинолатный сорт. Повышенная продуктивность и высокое качество семян

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Липецкая область**
23,4 ц/га



ПРОМЕТЕЙ®

РАПС ЯРОВОЙ

42 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность

Регион допуска
5, 7, 9, 10

Группа спелости
Среднепоздняя

Преимущества
Высокая адаптивность и качество семян, повышенная семенная продуктивность и масличность

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	90–103
Масличность, %	47
Содержание белка, %	25
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,3–4,2
Урожай зелёной массы, т/га	26

Особенности

Технологичный безэруковый сорт, гарантирует получение масла и шрота, соответствующих мировым стандартам качества. Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели

Урожайность в производственных посевах



● **Томская область**
39,6 ц/га



СИРИУС®

РАПС ЯРОВОЙ

37 ц/га
потенциальная урожайность


Высокая адаптивность и качество семян

Регион допуска
2, 10, 11


Группа спелости
Среднепоздняя

Преимущества
Повышенная урожайность, высокое качество масла и шрота


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Засухоустойчивость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	88–102
Масличность, %	46
Содержание белка, %	25
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,2–4,0
Урожай зелёной массы, т/га	35


Особенности

Технологичный безэруковый сорт. Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели

Урожайность в производственных посевах



● **Алтайский край**
29,4 ц/га



СПУТНИК КЛ®

РАПС ЯРОВОЙ

41 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам

Регион допуска
1 (на зелёный корм),
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Группа спелости
Среднепоздняя

Преимущества
Высокая технологичность и низкое содержание глюкозинолатов в семенах

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	89–105
Масличность, %	45
Содержание белка, %	26
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,4–3,8
Урожай зелёной массы, т/га	—

Особенности

Безэруковый сорт. Высокая продуктивность во многих регионах России, формирование высококачественных семян

Урожайность в производственных посевах



● **Липецкая область**
37,3 ц/га



ФАВОРИТ®

РАПС ЯРОВОЙ

39 ц/га
потенциальная урожайность


Высокая семенная продуктивность и масличность

Регион допуска
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11


Группа спелости
Среднепоздняя

Преимущества
Высокая и стабильная продуктивность во многих регионах России


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Засухоустойчивость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	88–101
Масличность, %	46
Содержание белка, %	25
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	3,1–3,5
Урожай зелёной массы, т/га	34

Особенности

Технологичный безэруковый сорт, пригодный к механизированной уборке. Семена с высоким качеством масла и шрота. Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели

Урожайность в производственных посевах



● **Тюменская область**
36,2 ц/га



АКТИВ

РАПС ОЗИМЫЙ

50 ц/га
потенциальная урожайность

Скороспелость

Регион испытания
2, 3, 5, 6

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Более короткий вегетационный период, низкорослость, дружность цветения и созревания

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Зимостойкость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9


Характеристики

Вегетационный период, сут.	258–260
Масличность, %	47
Содержание белка, %	21
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–15
Масса 1000 семян, г	4,0–4,5
Урожай зелёной массы, т/га	63
Энергия развития весной	средняя
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	ранний

Особенности

Устойчив к полеганию растений, толерантен к фомозу. Отзывчив на высокий агрофон. Реализует потенциал продуктивности в условиях дефицита влаги

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Липецкая область**
35,0 ц/га

● **Московская область**
38,8 ц/га



ЭЛВИС®

РАПС ОЗИМЫЙ

48 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая масличность и зимостойкость

Регион допуска
2, 6

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность, стабильная урожайность в различных почвенно-климатических условиях, высокая приспособленность к ухудшению погодных условий

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Зимостойкость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Характеристики

Вегетационный период, сут.	260–265
Масличность, %	49
Содержание белка, %	21
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–15
Масса 1000 семян, г	4,2–4,4
Урожай зелёной массы, т/га	65
Энергия развития весной	высокая
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	выше среднего
Старт весеннего развития	ранний


Особенности

Рекомендуется сеять в более поздние сроки, так как обладает интенсивными темпами роста. Отзывчив на высокий агрофон. Раннее созревание позволяет провести уборку до основных уборочных работ озимых колосовых

Урожайность в производственных посевах



● **Республика Адыгея**
46,3 ц/га



ДЕБЮТ®

ГИБРИД РАПСА ОЗИМОГО

56 ц/га
потенциальная урожайность


Первый отечественный гибрид озимого рапса

Регион допуска
2, 3, 5, 6


Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Сочетание высокой потенциальной урожайности с высокой масличностью и адаптивностью, устойчивостью к осыпанию и полеганию


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Зимостойкость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз




Характеристики

Вегетационный период, сут.	260–266
Масличность, %	48
Содержание белка, %	24
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	20–23
Масса 1000 семян, г	4,8–5,1
Урожай зелёной массы, т/га	72
Энергия развития весной	высокая
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	ранний


Особенности

Высокоадаптивный, высокоурожайный гибрид. Характеризуется высокими темпами роста растений в осеннюю вегетацию. Отличается высокой зимостойкостью. Наряду с высокой масличностью имеет повышенное содержание белка в семенах

Урожайность в производственных посевах



● **Ставропольский край**
55,9 ц/га



ЛОРИС®

РАПС ОЗИМЫЙ

50 ц/га
потенциальная урожайность

Устойчивость к стрессовым факторам

Регион допуска
2, 3, 5, 6

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокий уровень зимостойкости и устойчивости к полеганию

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Зимостойкость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	262–267
Масличность, %	47
Содержание белка, %	21
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	13–15
Масса 1000 семян, г	4,3–5,0
Урожай зелёной массы, т/га	70
Энергия развития весной	высокая
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	выше среднего
Старт весеннего развития	средний

Особенности

Высокопродуктивный стабильный сорт, характеризуется устойчивостью к стрессовым факторам. Сорт лучше сеять в оптимальные сроки, поскольку он имеет средние темпы роста во время осенней вегетации. Отзывчив на высокий агрофон. Выдерживает часто наблюдающиеся в условиях юга РФ высокие температуры и дефицит влаги

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
52,5 ц/га



САРМАТ®

РАПС ОЗИМЫЙ

54 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая продуктивность, пластичность и адаптивность

Регион допуска
2, 5, 6

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Толерантность к стрессам, может выращиваться в рисовых севооборотах на переуплотнённых и подкисленных почвах

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Зимостойкость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9


Характеристики

Вегетационный период, сут.	264–268
Масличность, %	48
Содержание белка, %	21
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	4,5–4,9
Урожай зелёной массы, т/га	68
Энергия развития весной	высокая
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	ранний


Особенности

Сорт рассчитан для поздних и оптимальных сроков сева, так как интенсивно развивается с осени. Характеризуется ранним цветением, менее склонен к осыпанию, полеганию и к поражению фомозом, что позволяет сократить потери урожая в период созревания и уборки. Отзывчив на высокий агрофон и технологичен в уборке

Урожайность в производственных посевах



- **Ставропольский край**
  52,6 ц/га
- **Краснодарский край**
  47,9 ц/га



СЕЛЕГОР®

РАПС ОЗИМЫЙ

55 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая степень адаптации к природным условиям возделывания

Регион допуска
3, 5, 6

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Высокая отзывчивость на улучшение условий возделывания и генетическая гибкость

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Зимостойкость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	265–270
Масличность, %	47
Содержание белка, %	21
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	4,9–5,1
Урожай зелёной массы, т/га	70
Энергия развития весной	средняя
Энергия развития осенью	средняя
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	средний


Особенности

Имеет замедленное развитие с осени в сравнении с другими сортами, поэтому не перерастает. Сорт лучше сеять в ранние сроки. Имеет высокий балл ветвления и обладает значительной компенсаторной способностью. Характеризуется длинным стручком и крупными семенами

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
54,2 ц/га



ОЛИВИН®

РАПС ОЗИМЫЙ

40 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание олеиновой кислоты — более 79 %

Регион допуска
2, 6

Группа спелости
Среднепоздняя

Преимущества
Высокое содержание олеиновой и низкое линоленовой кислот позволяют увеличить сроки хранения масла и значительно повысить его термостабильность

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Зимостойкость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	267–272
Масличность, %	49
Содержание белка, %	21
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	15–16
Масса 1000 семян, г	4,0–4,2
Урожай зелёной массы, т/га	65
Энергия развития весной	низкая
Энергия развития осенью	низкая
Склонность к ветвлению	средняя
Старт весеннего развития	поздний

Особенности

Источник высококачественного масла, устойчивого к окислению, с оптимальным соотношением омега-3 и омега-6 жирных кислот и высокими вкусовыми качествами. Устойчив к полеганию и болезням. Обладает высокой зимостойкостью, процент перезимовки составляет 90 %. Характеризуется высокой стабильностью урожая, выравненностью растений, дружностью цветения и созревания

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
39,9 ц/га



ГОРЧИЦА



БЭЛЛА®

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

20 ц/га
потенциальная урожайность

Низкое содержание эруковой кислоты в масле

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность, выравненность растений по высоте, дружное цветение и созревание

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	75–77
Масличность, %	30
Эруковая кислота, %	0,9–1,7
Эфиромасличность, %	0,10
Масса 1000 семян, г	5,6
Урожай зелёной массы, т/га	25

Особенности

Сорт рекомендован для возделывания на зерно, зелёный корм и сидерат во всех регионах РФ. Может быть использован для производства столовой горчицы

Урожайность в производственных посевах



● **Ивановская область**
20,0 ц/га



КОЛЛА®

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

21 ц/га
потенциальная урожайность

Высокий урожай зелёной массы

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая степень адаптивности к условиям всех зон возделывания

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	80–85
Масличность, %	30
Эруковая кислота, %	39,0–41,0
Эфиромасличность, %	0,19
Масса 1000 семян, г	5,3
Урожай зелёной массы, т/га	35

Особенности

Отличный сорт для сидерата. Растения характеризуются быстрой минерализацией в почве, высоким урожаем зелёной массы. Сорт устойчив к полеганию, высокоустойчив к осыпанию

Урожайность в производственных посевах



● **Ивановская область**
19,3 ц/га



РАПСОДИЯ®

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

22 ц/га
потенциальная урожайность

Самый распространённый сорт в РФ

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Высокая урожайность, устойчивость к биотическим факторам

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	64–76
Масличность, %	30
Эруковая кислота, %	33,0–37,0
Эфиромасличность, %	0,17
Масса 1000 семян, г	6,0
Урожай зелёной массы, т/га	30


Особенности

Рекомендуется для возделывания на семена и кормовые цели, также может использоваться как сидеральная и медоносная культура

Урожайность в производственных посевах



● **Липецкая область**
22,0 ц/га



ПИКАНТО®

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

27 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность

Регион допуска
6

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокое содержание масла в семенах, низкое – эруковой кислоты (2 %)

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**


Характеристики

Вегетационный период, сут.	70–75
Масличность, %	28
Эруковая кислота, %	1,8–2,0
Эфиромасличность, %	0,09
Масса 1000 семян, г	5,6
Урожай зелёной массы, т/га	28

Особенности

Растения формируют крупные семена, являются отличным сидератом. Шрот (жмых) пригоден для приготовления мягкой английской горчицы. Сорт устойчив к полеганию растений и осыпанию семян

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Краснодарский край**
24,4 ц/га



РАДУГА®

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

25 ц/га
потенциальная урожайность

Адаптивность к условиям всех зон возделывания

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Низкое содержание эруковой кислоты в масле, высокая урожайность

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	70–75
Масличность, %	30
Эруковая кислота, %	2,0–2,7
Эфиромасличность, %	0,09
Масса 1000 семян, г	5,8
Урожай зелёной массы, т/га	30

Особенности

Сорт обладает высокими начальными темпами роста, является отличным зелёным удобрением. Семена крупные, окраска однородная, светло-жёлтая

Урожайность в производственных посевах



- **Республика Крым** 23,5 ц/га
- **Воронежская область** 25,0 ц/га
- **Московская область** 21,0 ц/га



РУСЛАНА®

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

27 ц/га
потенциальная урожайность

Очень низкое содержание эруковой кислоты в масле

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая урожайность, повышенная устойчивость к основным патогенам

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	70–75
Масличность, %	29
Эруковая кислота, %	0,5–1,0
Эфиромасличность, %	0,07
Масса 1000 семян, г	5,3
Урожай зелёной массы, т/га	28

Особенности

Сорт может использоваться в качестве сидеральной, масличной и медоносной культуры. Жмых пригоден для столовой горчицы, а зелёная масса, богатая кальцием, фосфором, каротином, – для корма. Растения отличаются большим количеством боковых ветвей на растении, устойчивостью к полеганию, выравненностью растений по высоте, дружности цветения и созревания

Урожайность в производственных посевах



- **Орловская область**
  28,7 ц/га
- **Московская область**
  20,0 ц/га



ФЕЯ®

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

20 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая стабильность урожая

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая адаптивность к условиям недостаточного и неустойчивого увлажнения

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	70–80
Масличность, %	29
Эруковая кислота, %	35,0–38,0
Эфиромасличность, %	0,08
Масса 1000 семян, г	4,8
Урожай зелёной массы, т/га	25


Особенности

Для сорта характерна высокая продуктивность, пластичность. Растения устойчивы к полеганию, осыпанию семян, пригодны к механизированной уборке

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
18,7 ц/га



ВАЛЕНТА®

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

35 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенное содержание жира в семенах

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Устойчивость к почвенной и воздушной засухе, выравненность растений по высоте, дружности цветения и созревания

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	80–83
Масличность, %	52
Эруковая кислота, %	0,3–0,7
Эфиромасличность, %	0,60
Масса 1000 семян, г	4,3
Урожай зелёной массы, т/га	27

Особенности

Масло не содержит эруковой кислоты. Шрот (жмых) пригоден для использования в виде горчичного порошка для приготовления столовой горчицы и в качестве кормового концентрата для сельскохозяйственных животных

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
27,7 ц/га



ГОРЛИНКА®

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

36 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенное содержание эфирного масла в семенах

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Устойчивость к почвенной засухе и действию высоких температур, высокая степень адаптивности к условиям всех зон возделывания

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	77–78
Масличность, %	50
Эруковая кислота, %	0,0–0,5
Эфиромасличность, %	0,75
Масса 1000 семян, г	3,7
Урожай зелёной массы, т/га	25


Особенности

Растения сорта выравнены по высоте, времени цветения и созревания. Эруковая кислота в масле отсутствует. Эфирное масло содержит аллилизотиоцианат, который является соединением, отвечающим за острый вкус, а также выступает натуральным консервантом и ценной пищевой добавкой

Урожайность в производственных посевах



● **Волгоградская область**
35,7 ц/га



ДЮНА®

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

37 ц/га
потенциальная урожайность

Высокое содержание эфирного масла

Регион допуска
5, 6

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая потенциальная урожайность, источник сырья с повышенным содержанием антиоксидантов и фитонцидов

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	83–84
Масличность, %	44
Эруковая кислота, %	0,3–0,7
Эфиромасличность, %	0,76
Масса 1000 семян, г	3,1
Урожай зелёной массы, т/га	30

Особенности

Масло не содержит эруковой кислоты, семена имеют коричневую окраску. Пригоден для приготовления дижонской горчицы. Рекомендуется для возделывания на зерно, зелёный корм и сидерат во всех регионах РФ. Высокая устойчивость к полеганию и осыпанию

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
40,0 ц/га



МАРИЯ®

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

27 ц/га
потенциальная урожайность

Адаптивность к условиям всех зон возделывания

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Полное отсутствие эруковой кислоты в масле, устойчивость к болезням, пригодность к механизированной уборке

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	81–83
Масличность, %	45
Эруковая кислота, %	0,0–0,3
Эфиромасличность, %	0,63
Масса 1000 семян, г	3,1
Урожай зелёной массы, т/га	27

Особенности

Предназначен для производства семян с целью получения пищевого масла и шрота для использования на зелёный корм. Растение высокое, расположение первого разветвления низкое

Урожайность в производственных посевах



● **Липецкая область**
25,1 ц/га



НИКА®

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

33 ц/га
потенциальная урожайность

Адаптивный, усточив к стрессам

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Устойчивость к почвенной засухе, действию высоких температур и основным болезням

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	75–80
Масличность, %	49
Эруковая кислота, %	0,0–0,5
Эфиромасличность, %	0,62
Масса 1000 семян, г	3,7
Урожай зелёной массы, т/га	30


Особенности

Высокопродуктивный сорт. Выравнен по высоте растений, времени цветения и созревания, не полегает. Хорошо адаптирован к климатическим условиям всех зон возделывания, стрессоустойчив, не осыпается

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
33,0 ц/га



ГАЛАТЕЯ®

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

38 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая урожайность

Регион допуска
5, 6, 10

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Высокая потенциальная продуктивность, высокая степень адаптивности к условиям всех зон возделывания

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	76–82
Масличность, %	51
Эруковая кислота, %	0,0–0,5
Эфиромасличность, %	0,65
Масса 1000 семян, г	3,7
Урожай зелёной массы, т/га	32

Особенности

Характеризуется повышенным показателем урожая зелёной массы. Имеет высокий балл ветвления, обладает более высокой устойчивостью к полеганию и болезням

Урожайность в производственных посевах



● **Липецкая область**
37,6 ц/га



ЮНОНА®

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

37 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенное содержание олеиновой кислоты в масле семян — более 53 %

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества
Устойчивость к почвенной засухе и действию высоких температур

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	78–83
Масличность, %	50
Эруковая кислота, %	0,0–0,5
Эфиромасличность, %	0,65
Масса 1000 семян, г	3,8
Урожай зелёной массы, т/га	33

Особенности

Рекомендован для использования в качестве высокопротеиновой кормовой добавки и сидеральной культуры. Сорт высокопродуктивный, выравнен по высоте, времени цветения и созревания

Урожайность в производственных посевах



● **Ставропольский край**
36,0 ц/га



АЛИСА®

ГОРЧИЦА ЯРОВАЯ САРЕПТСКАЯ

28 ц/га
потенциальная урожайность


Высокая приспособленность к условиям недостаточного и неустойчивого увлажнения

Регион допуска
Все регионы РФ


Группа спелости
Средняя

Преимущества
Холодостойкость, повышенное содержание олеиновой и линоленовой жирных кислот, полное отсутствие эруковой кислоты

Устойчивость к полеганию




Засухоустойчивость




Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса



Пероноспороз



Альтернариоз




Характеристики

Вегетационный период, сут.	85–87
Масличность, %	49
Эруковая кислота, %	0,0–0,2
Эфиромасличность, %	0,65
Масса 1000 семян, г	3,4
Урожай зелёной массы, т/га	28

Особенности

Всходы способны выдерживать кратковременные заморозки (до минус 5 °С). Растения хорошо выравнены по высоте, дружно зацветают и созревают. Сорт приспособлен к механизированной уборке. Предназначен для производства семян с целью получения пищевого масла и шрота с высоким содержанием аллилового масла

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
26,4 ц/га



НИАГАРА®

ГОРЧИЦА ЧЁРНАЯ

20 ц/га
потенциальная урожайность

Повышенное содержание эфирного масла

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Источник аллилизотиоцианатов (натуральный консервант), повышенные медоносные свойства по сравнению с горчицей белой и сарептской. Не поражается насекомыми-вредителями

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	70–75
Масличность, %	40
Эруковая кислота, %	35,0–37,0
Эфиромасличность, %	1,10
Масса 1000 семян, г	2,7
Урожай зелёной массы, т/га	18

Особенности

Первый в отечественном производстве сорт горчицы чёрной. Семена и шрот (жмых) пригодны для приготовления оригинальных сортов столовой горчицы. Семена обладают чрезвычайно острым, терпким вкусом, напоминающим хрен и предназначены для приготовления столовой горчицы дижонской

Урожайность в производственных посевах



● **Республика Крым**
18,0 ц/га



ДЖУНА

ГОРЧИЦА ОЗИМАЯ САРЕПТСКАЯ

30 ц/га
потенциальная урожайность

Зимостойкость

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Среднепоздняя

Преимущества
Высокая продуктивность, высокие темпы роста растений во время осенней вегетации

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	270–275
Масличность, %	46
Эруковая кислота, %	0,0–0,5
Эфиромасличность, %	0,60
Масса 1000 семян, г	3,5
Урожай зелёной массы, т/га	70
Энергия развития весной	средняя
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	средний

Особенности

Растения способны выдерживать минимальные температуры воздуха до минус 16 °С при отсутствии снежного покрова и температуры почвы до минус 8 °С на глубине корневой шейки (3 см). Масло семян не содержит эруковой кислоты, относится к пищевым жирам. Шрот (жмых) пригоден для приготовления столовой горчицы, кормового концентрата

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
27,5 ц/га



ВЬЮЖАНКА®

ГОРЧИЦА ОЗИМАЯ САРЕПТСКАЯ

34 ц/га
потенциальная урожайность


Повышенная зимостойкость

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Среднепоздняя


Преимущества
Полное отсутствие эруковой кислоты в масле семян, содержание аллилгорчичного масла в семенах в пределах 0,60 %

Устойчивость к полеганию




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	272–274
Масличность, %	46
Эруковая кислота, %	0,0–0,5
Эфиромасличность, %	0,60
Масса 1000 семян, г	3,5
Урожай зелёной массы, т/га	65
Энергия развития весной	средняя
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	средний

Особенности

При отсутствии снежного покрова выдерживает температуру воздуха на уровне минус 16 °С и температуру почвы на уровне минус 7 °С на глубине залегания корневой шейки. Растения характеризуются меньшей высотой и большей выравненностью, дружностью цветения и созревания. Пригоден к механизированной уборке. Предназначен для производства семян с целью получения пищевого масла и шрота

Урожайность в производственных посевах



● Краснодарский край
31,7 ц/га





СУРЕПИЦА



ГРАЦИЯ®

СУРЕПИЦА ЯРОВАЯ

20 ц/га
потенциальная урожайность

Скороспелость и высокая продуктивность

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Устойчивость к полеганию, жёлтосемянность, низкое содержание глюкозинолатов в семенах и эруковой кислоты в масле

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	66–69
Масличность, %	49
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	49
Эруковая кислота, %	0,35
Масса 1000 семян, г	2,7
Урожай зелёной массы, т/га	17

Особенности

Высокий потенциал продуктивности. Среднеустойчив к засухе, созревает дружно, пригоден к механизированной уборке. Благодаря своей скороспелости рекомендован для возделывания повсеместно по РФ

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
20,0 ц/га



ЗОЛОТИСТАЯ

СУРЕПИЦА ЯРОВАЯ

23 ц/га
потенциальная урожайность

Гарант получения пищевого масла высокого качества

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность, скороспелость

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	70–75
Масличность, %	48
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Эруковая кислота, %	0,01
Масса 1000 семян, г	2,3
Урожай зелёной массы, т/га	22


Особенности

Жёлтосемянный, безэруковый, низкоглюкозинолатный сорт. Низкое содержание клетчатки, легнина и синапина позволяет широко использовать шрот для кормления всех видов животных и птицы. Средняя устойчивость к засухе

Урожайность в производственных посевах



● **Ростовская область**
22,1 ц/га



МЕДОВАЯ®

СУРЕПИЦА ЯРОВАЯ

25 ц/га
потенциальная урожайность

Низкое содержание глюкозинолатов в семенах

Регион допуска
5, 6, 10

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность, масличность и содержание белка

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	70–72
Масличность, %	48
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	12–13
Эруковая кислота, %	0,01
Масса 1000 семян, г	2,4
Урожай зелёной массы, т/га	22

Особенности

Ярко-жёлтый цвет семян, пониженная лузжистость, низкое содержание глюкозинолатов в семенах повышают кормовую ценность жмыха (шрота) для животных и птиц. Жирно-кислотный состав масла соответствует требованиям, предъявляемым к высококачественным салатным маслам. Масло имеет оптимальное соотношение омега-9, омега-6, омега-3 для здорового питания человека

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
24,9 ц/га



ГОРДЕЯ®

СУРЕПИЦА ОЗИМАЯ

38 ц/га
потенциальная урожайность


Высокая урожайность семян и зелёной массы

Регион допуска
Все регионы РФ


Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая зимостойкость, укороченный вегетационный период, пониженная лузжистость семян и жёлтая окраска семенной оболочки


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Зимостойкость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	252–257
Масличность, %	51
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	12–14
Эруковая кислота, %	0,01
Масса 1000 семян, г	3,0
Урожай зелёной массы, т/га	52
Энергия развития весной	высокая
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	среднеранний

Особенности

Высокопродуктивный, высокомасличный, безэруковый, низкоглюкозинолатный, жёлтосемянный сорт. Шрот и жмых сурепицы имеют более высокую кормовую ценность за счёт низкого содержания в них клетчатки, лигнина, глюкозинолатов и других нежелательных веществ

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
37,1 ц/га



ЛЮБАВА®

СУРЕПИЦА ОЗИМАЯ

35 ц/га
потенциальная урожайность


Высокая адаптивность к климатическим условиям всех зон возделывания

Регион допуска
Все регионы РФ


Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Высокая продуктивность, масличность и зимостойкость


Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Зимостойкость




Устойчивость к болезням


Фузариоз




Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	245–255
Масличность, %	49
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	11–12
Эруковая кислота, %	0,01
Масса 1000 семян, г	3,2
Урожай зелёной массы, т/га	50
Энергия развития весной	высокая
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	ранний

Особенности

Безэруковый, низкоглюкозинолатный, жёлтосемянный сорт. Созревает раньше рапса на 10–15 дней. Качество масла и жмыха соответствует мировым стандартам. Пригоден для использования на зелёный корм

Урожайность в производственных посевах



● **Липецкая область**
34,9 ц/га



РЫЖИК



КРЕПЫШ

РЫЖИК ЯРОВОЙ

24 ц/га
потенциальная урожайность

Низкое содержание эруковой кислоты в масле, крупносемянность

Регион испытания
9, 10, 11

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества
Улучшенный жирнокислотный состав масла, устойчивость к белой ржавчине

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	69–71
Масличность, %	41
Эруковая кислота, %	2,5–2,7
Масса 1000 семян, г	2,2

Особенности

Предназначен для получения пищевого и технического масла, а также высокопитательного жмыха (после тепловой обработки). Пригоден для возделывания на зерно

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● **Курганская область**
21,2 ц/га



КРИСТАЛЛ®

РЫЖИК ЯРОВОЙ

23 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая адаптивность и пластичность

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Устойчивость к стрессовым факторам, вредителям и болезням, выравненность по высоте, дружности цветения и созревания

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Характеристики

Вегетационный период, сут.	70–74
Масличность, %	41
Эруковая кислота, %	2,5–3,0
Масса 1000 семян, г	1,0

Особенности

Характеризуется высокой холодостойкостью, хорошо переносит засуху. Рыжиковое масло является источником ненасыщенных жирных кислот, в том числе олеиновой (омега-9), линолевой (омега-6) и линоленовой (омега-3)

Урожайность в производственных посевах



● **Ставропольский край**
23,0 ц/га

● **Республика Крым**
19,6 ц/га



ОМИЧ®

РЫЖИК ЯРОВОЙ

20 ц/га
потенциальная урожайность

Скороспелость

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Повышенная масличность, пригоден для выращивания семян с целью получения пищевого растительного масла и жмыха

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	75–78
Масличность, %	42
Эруковая кислота, %	1,8–2,0
Масса 1000 семян, г	1,2

Особенности

Устойчив к полеганию, засухе, повреждению вредителями. Дружно созревает, пригоден к механизированной уборке. Устойчив к белой гнили и фузариозу

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
18,0 ц/га



КАРАТ®

РЫЖИК ОЗИМЫЙ

30 ц/га
потенциальная урожайность

Холодостойкость, высокая продуктивность

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества

Семена способны прорастать при плюс 1 °С, всходы выдерживают заморозки до минус 10 °С. Короткий вегетационный период позволяет эффективно использовать весенние запасы влаги для формирования урожая

Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Зимостойкость

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Устойчивость к болезням

Фузариоз

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

Альтернариоз

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

Пероноспороз

1 2 3 4 5 **6** 7 8 9

Фомоз

1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

Характеристики

Вегетационный период, сут.	225–230
Масличность, %	40
Эруковая кислота, %	2,5–3,0
Масса 1000 семян, г	0,9
Энергия развития весной	высокая
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	ранний

Особенности

Отличается повышенной толерантностью к основным патогенам. Устойчив к полеганию, почвенной засухе, повреждению вредителями и действию высоких температур. Выравнен по высоте растений, времени цветения и созревания

Урожайность в производственных посевах



● **Краснодарский край**
29,2 ц/га

● **Липецкая область**
26,0 ц/га





ДРУГИЕ МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ



АЛЕКСЕЕВСКИЙ 413

КОРИАНДР

12 ц/га
потенциальная урожайность

Для производства эфирного масла и использования плодов в пищевой промышленности

Регион допуска
Все регионы РФ

Преимущества
Не полегает, устойчив к осыпанию

Характеристики

Вегетационный период, сут.	104
Эфиромасличность, %	2,6
Масса 1000 плодов, г	5,9

Особенности

Предназначен для получения пищевого и технического масла, а также высокопитательного жмыха (после тепловой обработки). Пригоден для возделывания на зерно



РОЗОВСКАЯ АРОМА®

МЯТА

16 ц/га
потенциальная урожайность

Отличается высоким содержанием эфирного масла в зелёной массе

Регион допуска
Все регионы РФ

Преимущества
Высокая зимостойкость, устойчивость к полеганию и засухе

Характеристики

Эфиромасличность, %	4,7
Урожай сухих листьев, т/га	27
Высота растения, см	95

Особенности

Сорт отличается мощным габитусом куста, повышенным урожаем зелёной массы и сухих листьев, а также повышенным сбором эфирного масла. Предназначен для получения эфирного масла, сухого листа, а также как декоративное садовое растение





ВОЗНЕСЕНСКАЯ 34

ЛАВАНДА

33 ц/га
потенциальная урожайность

Средняя зимостойкость

Регион допуска
Все регионы РФ

Преимущества
Одно из самых душистых многолетних растений с ценными лекарственными, пряно-ароматическими и медоносными свойствами

Характеристики

Эфиромасличность, %	4,7
Высота растения, см	55

Особенности

Имеет сильные антисептические и антиспазматические свойства, способствует быстрому заживлению ран. Применяется при бронхитах, невралгиях, улучшает аппетит, используется для лечебных ванн



ВОЗНЕСЕНСКАЯ АРОМА®

ЛАВАНДА

39 ц/га
потенциальная урожайность

Содержание основного компонента линалилацетата в эфирном масле 35,3 %

Регион допуска
Все регионы РФ

Преимущества
Зимостойкий сорт, пригоден к механизированной уборке

Характеристики

Эфиромасличность, %	4,9
Высота растения, см	77

Особенности

Назначение сорта: для получения эфирного масла, подсушенного цветочного сырья, как садовое растение





ВОЗНЕСЕНСКИЙ 24

ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ

12 ц/га
потенциальная урожайность

Сорт среднеспелый и зимостойкий

Регион допуска
Все регионы РФ

Преимущества
Высокая устойчивость к фузариозному увяданию и мучнистой росе

Характеристики

Эфиромасличность, %	0,51
Урожай соцветий (1 год), т/га	7,8
Урожай соцветий (2 год), т/га	11,3
Высота растения, см	127

Особенности

Многолетнее эфиромасличное лекарственное и декоративное растение. Светолюбив, засухоустойчив и теплолюбив, к почвам нетребователен. Лекарственными свойствами обладают соцветия и листья



ТАТЬЯНА®

ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ

14 ц/га
потенциальная урожайность

Сорт высокоэфиромасличный, зимостойкий

Регион допуска
Все регионы РФ

Преимущества
Отличается повышенным содержанием эфирного масла в соцветиях и высокими сборами эфирного масла

Характеристики

Эфиромасличность, %	0,47
Урожай соцветий (1 год), т/га	8,6
Урожай соцветий (2 год), т/га	13,8
Высота растения, см	140

Особенности

Сорт предназначен для промышленного получения эфирного масла для парфюмерной промышленности. Отличается зимостойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям, пригоден к механизированной уборке. Подзимний посев осуществляется в октябре – ноябре, летний – в июле – августе, лучшими предшественниками являются чистые пары и озимые колосовые культуры





СОЛНЕЧНЫЙ

КУНЖУТ

10 ц/га
потенциальная урожайность

Высокая технологичность возделывания

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Растения средней высоты, слабответвистые, дружно созревают

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95–105
Масличность, %	58
Масса 1000 семян, г	3,0
Высота растения, см	200

Особенности

Сорт засухоустойчив, устойчив к болезням. Засухоустойчив. При созревании листья опадают. Семена белые. Отличается высокой технологичностью возделывания и дает высокий экономический эффект



УДАЧА®

КЛЕЩЕВИНА

13 ц/га
потенциальная урожайность

Направление использование — техническое (масло)

Регион допуска
Все регионы РФ

Преимущества
Устойчив к фузариозу и серой гнили, а также к абиотическим факторам полеганию, осыпанию, засухе

Характеристики

Вегетационный период, сут.	120–130
Масличность, %	54
Масса 1000 семян, г	320
Высота растения, см	180

Особенности

Пригоден к индустриальной технологии возделывания. Посев при температуре почвы 10–12 °С. Рекомендуемая густота стояния растений – 30 тыс./га Устойчив к болезням и полеганию, отличается хорошей технологичностью возделывания и дает высокий экономический эффект. Приспособлен к механизированной уборке





АЛМАЗ®

САФЛОР

15 ц/га
потенциальная урожайность

Сорт засухоустойчив, усточив к болезням

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Ранняя

Преимущества
Растение средней высоты, дружно созревает

Характеристики

Вегетационный период, сут.	95–105
Масличность, %	40
Масса 1000 семян, г	55
Высота растения, см	80

Особенности

Листья без шипов, цветки имеют оранжевую окраску венчика, семена белые. Окраска семядолей, окраска листьев и подсемядольного колена зеленая. Корень стержневой, стебель прямостоячий, ветвистый. Лист овальный, без антоциана, опушение отсутствует. Средняя степень облиственности



ЛИДЕР®

САФЛОР

23 ц/га
потенциальная урожайность

Высокий потенциал продуктивности

Регион допуска
Все регионы РФ

Группа спелости
Средняя

Преимущества
Универсальный медонос

Характеристики

Вегетационный период, сут.	98–109
Масличность, %	34
Масса 1000 семян, г	32
Высота растения, см	85

Особенности

Листья и листочки обёртки с шипами, цветки имеют яркую оранжевую окраску венчика, к окончанию цветения - красную, семена белые. Сорт адаптирован к условиям недостаточного и неустойчивого увлажнения, устойчив к болезням





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК)

350038, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕМЯН ОБРАЩАТЬСЯ:

8 (800) 700-75-85

8 (861) 259-15-14, 275-85-13, 274-64-98

semena@vniimk.ru

СПРАВКИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

ПОДСОЛНЕЧНИКА: (861) 254-13-59

СОИ: (861) 275-78-45

РАПСА: (861) 275-79-10


ПРЕСС-ЦЕНТР:

8 (861) 254-05-18

marketing@vniimk.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

info@vniimk.ru



АРМАВИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ — ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

352925, Краснодарский край,
г. Армавир,
пос. Центральной усадьбы
опытной станции ВНИИМК

8 (8537) 313-76

stanciya-vniimk@yandex.ru,
armavir-vniimk@yandex.ru

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

352529, Краснодарский край,
Лабинский район,
пос. Розовый, ул. Ленина, д.9

8 (86169) 76-242

shalfey@vniimk.ru

ДОНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Л.А. ЖДАНОВА — ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

346754, Ростовская область,
Азовский район,
пос. Опорный, ул. Жданова, д. 2.

8 (86342) 75-1-21

post@dos-vniimk.ru,
gnudos@mail.ru

ЛИПЕЦКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАПСА — ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

398037, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Боевой проезд, 26

8 (4742) 34-63-61

info@lniir.ru

СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ — ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

646025, Омская область,
г. Исилькуль, ул. Строителей, д. 2

8 (38173) 21-413

sosvniimk@mail.ru

ОПЫТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «БЕРЕЗАНСКОЕ» УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

353156, Краснодарский край,
Кореновский район,
пос. Новоберезанский,
ул. Пионерская, д. 14

8 (86142) 51-89-3

ocx@vniimk.ru

ОПЫТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «УРУПСКОЕ» — ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

352230 Краснодарский край,
Новокубанский муниципальный район,
ст. Советская, ул. Ленина д. 16

8 (86195) 5-36-42 (доб.) 203

urupskoe@mail.ru



Представленные материалы в каталоге носят информационный характер и основаны на результатах, полученных в оптимальных условиях внутренних и производственных испытаний

ВНИИМК



8 (800) 700-75-85
350038, г. Краснодар,
ул. им. Филатова, д. 17
semena@vniimk.ru
www.vniimk.ru